

Обзоры, проблемы

УДК 635.21:632.3:578.2

doi: 10.15389/agrobiologia.2025.5.777rus

ВИРУСЫ КАРТОФЕЛЯ В РОССИИ*
(обзор)М.В. ЛЕБЕДЕВА, М.Н. ПОЛЯКОВА, В.В. ТАРАНОВ[✉]

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) — одна из важнейших возделываемых культур в России. Из-за вегетативного способа размножения для картофеля особенно опасны вирусные заболевания, которые приводят к резкому снижению урожайности и качеству клубней. Согласно межгосударственным стандартам при производстве семенного картофеля в регионах России необходимо проводить тестирование на наличие 6 наиболее значимых вирусов, которые выявляют методами ПЦР, ИФА и ИХА. Эти методы признаются равнозначными (ГОСТ 59551-2021), однако с их помощью можно выявить только относительно небольшое число штаммов ограниченного количества вирусов, тогда как известно более 50 разных вирусов, встречающихся на картофеле (J.F. Kreuze с соавт., 2020). Кроме того, согласно данным Росстата, в России большая часть посадок картофеля возделывается в частных хозяйствах, которые никак не контролируются. В связи с этим актуальный состав виромов и генетическое разнообразие вирусов картофеля в России остается малоисследованным. Только в последние годы стали появляться единичные работы по изучению вирусов картофеля с помощью высокопроизводительных методов секвенирования, позволяющих выявить весь комплекс вирусов и охарактеризовать их полные геномы. Цель настоящего обзора — познакомить читателей с актуальным состоянием исследования виромов картофеля, осветить достоинства и недостатки применяемых подходов, и привлечь внимание к недостатку работ по указанной тематике в России. Приведена общая характеристика наиболее распространенных вирусов картофеля, рассматриваются работы, посвященные их геномному разнообразию и филогеографии. Обсуждаются достоинства и недостатки наиболее часто используемых лабораторных методов диагностики вирусов, основанных на детекции вирусных белков или нуклеиновых кислот (R. Kumar с соавт., 2019). Приводятся данные по изучению взаимодействия разных вирусов между собой при ко-инфекциях, так как смешанные инфекции зачастую приводят к кумулятивному эффекту (A.V. Moreno с соавт., 2020). Рассмотрены работы отечественных исследователей по диагностике вирусов картофеля с помощью лабораторных методов и показана неравномерность данных для разных регионов. Одной из проблем, которые усложняют характеристику репрезентативной выборки каждого вируса, становится большая площадь территорий в разных регионах Российской Федерации, на которых выращивается картофель. Решить эту проблему можно с внедрением методов высокопроизводительного секвенирования, развитие которых делает их более доступными для исследователей и которые активно применяются в ряде стран для рутинной диагностики вирусных инфекций картофеля.

Ключевые слова: *Solanum tuberosum* L., виром, вирусы картофеля, NGS, вирусный метагеном.

Картофель — важнейшая незерновая сельскохозяйственная культура, как во всем мире, так и в России. Площадь выращивания картофеля в России в 2023 году составила 1009 тыс. га, большая часть которых (72,3 %) относятся к личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) населения (<https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277#>). Одной из острых проблем картофелеводства остаются вирусные заболевания. Поскольку картофель размножается вегетативно, через клубни, в поколениях происходит аккумуляция вирусов и увеличение вирусной нагрузки, приводящей к значительным потерям урожая (1, 2). Помимо общего снижения продуктивности, вирусная инфекция может проявляться в виде некрозов клубней, например, при инфекции PLRV (Potato leaf roll virus) или некротическими штаммами PVY (Potato virus Y), что сильно ухудшает качество клубней (3). Заражение вирусами делает растение более восприимчивым к другим патогенам, например к *Phytophthora infestans* (4). Также есть свидетельства о том, что вирусная инфекция может увеличивать питательную ценность картофеля для листоядных жуков (5). По некоторым оценкам из-за вирусных заболеваний теряется 50 % и более от возможного урожая в развива-

* Исследование поддержано грантом Российского научного фонда № 23-76-01066.

ющихся странах (6). Проблема усугубляется тем, что, в отличие от патогенов грибной или бактериальной природы, не существует достаточно эффективных противовирусных химических препаратов (7). Используемые подходы чаще всего направлены на борьбу с вирусными векторами и в лучшем случае способны замедлить распространение инфекции в отдельных растениях. Помимо культивирования устойчивых сортов, фактически единственный способ получения безвирусного посадочного материала — это оздоровление через культуру *in vitro* с последующим микроклональным размножением и получением микроклубней (2). Если в промышленных посадках обычно используется оздоровленный семенной материал высоких репродукций, то в личных хозяйствах картофель зачастую культивируется клубнями в течение многих лет. Это приводит к накоплению вирусов в поколениях, созданию благоприятных условий для рекомбинаций между геномами разных вирусных изолятов и появлению очагов инфекции. Таким образом, исследования вирусов, поражающих картофель, актуально как в мире, так и в России.

Цель настоящего обзора — познакомить читателей с актуальным состоянием исследования вирусов картофеля, осветить достоинства и недостатки применяемых подходов, и привлечь внимание к недостатку работ по указанной тематике в России.

Число вирусов, которые выделяют из растений картофеля, постоянно растет. Если 25 лет назад (8, 9) насчитывали до 37 вирусов, инфицирующих картофель, то сейчас описано более 50, относящихся, по крайней мере, к 13 семействам (2). С одной стороны, это происходит благодаря широкому внедрению высокопроизводительных методов диагностики, которые позволяют идентифицировать новые вирусы, включая те, которые не вызывают ярких симптомов. С другой стороны, картофель выращивается в разных регионах по всему миру, а основными вирусными векторами служат насекомые, в большей мере разные виды тлей, но также трипсы (Tomato spotted wilt virus, TSWV; Tomato chlorotic spot virus, TCSV; Impatiens necrotic spot virus, INSV; Tobacco streak virus, TSV), белокрылки (Tomato chlorosis virus, ToCV; Tomato yellow vein streak virus, ToYVSV), жуки (Andean potato latent virus, APLV), кузнечики (Beet curly top virus, BctV). Значительная часть фитофагов способна питаться разными видами растений. Это приводит к тому, что местные виды насекомых, местные растительные вирусы, картофель и вирусы картофеля адаптируются друг к другу. Например, *Henosepilachna vigintioctomaculata*, 28-точковая божья коровка, стала основным вредителем картофеля на Дальнем Востоке России (10). Было показано, что помимо прямого ущерба от поедания листьев, она служит вектором для некоторых вирусов картофеля, в том числе тех, которые обычно передаются тлями, — PVY, PVS (Potato virus S), PLRV (11).

Большая часть вирусов картофеля относится к РНК-содержащим вирусам, но есть и несколько представителей семейств *Geminiviridae* и *Caulimoviridae*, чей геном представлен молекулами ДНК. Помимо этого для картофеля характерен вириод веретеновидности клубней (Potato spindle tuber viroid, PSTVd) и может встречаться вириод карликовости хризантем (*Chrysanthemum stunt pospoviroid*, CSVd) (12, 13).

Наибольшее количество вирусов зарегистрировано в Южной Америке, однако 14 из них встречаются по всему миру. Для ряда вирусов картофель служит основным или одним из основных растений-хозяев (табл. 1). Некоторые вирусы — TRV (Tobacco rattle virus), TMV (Tobacco mosaic virus), AMV (Alfalfa mosaic virus), SbMV (Sowbane mosaic virus), TNV (Tobacco necrosis virus), TSWV — не специфичны для картофеля, а обла-

дают большим кругом хозяев.

Характеристика геномов повсеместно распространенных вирусов, для которых картофель (*Solanum tuberosum* L.) служит основным хозяином (1-3, 9)

Вирус	Семейство	Основной переносчик или способ передачи	Строение генома	Число полногеномных сиквентов в базе NCBI
PVY (Potato virus Y) PVA (Potato virus A) PVV (Potato virus V)	<i>Potyviridae</i>	Тли	Геном — одноцепочечная +РНК размером ~9,8 kb. Содержит 2 ОРС. К 5'-концу РНК присоединен белок VPg. На 3'-конце — поли(А)-хвост.	~900 (102) 82 (0) 6 (0)
PVS (Potato virus S) PVM (Potato virus M)	<i>Betaflexiviridae</i>	Тли	Геном — одноцепочечная +РНК размером ~8,5 kb. Описано 6 ОРС. На 5'-конце РНК — кэп-структура. На 3'-конце — поли(А)-хвост.	158 (1) 34 (2)
PVX (Potato virus X) PAMV (Potato aucuba mosaic virus)	<i>Alphaflexiviridae</i>	Контактный способ передачи	Геном — одноцепочечная +РНК размером ~6,4 kb. Описано 5 ОРС. На 5'-конце РНК — кэп-структура. На 3'-конце — поли(А)-хвост.	416 (1) 13 (0)
PLRV (Potato leafroll virus)	<i>Solemoviridae</i> (ранее выделяли семейство <i>Luteoviridae</i>)	Тли	Геном — одноцепочечная +РНК размером ~5,9 kb. По разным данным содержит 6-8 ОРС. К 5'-концу РНК присоединен белок VPg.	123 (0)
PMTV (Potato mop-top virus)	<i>Virgaviridae</i>	Почвенный протист <i>Spongospora subterranea</i>	Геном представлен тремя фрагментами одноцепочечной +РНК размером 3-6,5 kb. Каждый фрагмент РНК кэпирован на 5'-конце и несет тРНК-подобную структуру на 3'-конце.	30 (0)

Примечание. PMTV представляет собой вирус с разделенным геномом, поэтому учитываются доступные полные последовательности самого большого фрагмента. В скобках указано число изолятов, собранных в России. ОРС — открытая рамка считывания.

Вирус картофеля Y — наиболее вредоносный для картофеля и экономически значимый для других культур, таких как табак, перец и томат (2, 3). Вследствие этого PVY оказался наиболее изученным вирусом картофеля и даже занял пятое место в топ-10 самых важных вирусов растений (14). PVY существует в виде комплекса штаммов, которые изначально выделялись на основании реакции растений-хозяев разных генотипов (15). Анализ большого числа полногеномных последовательностей изолятов из разных регионов (16-18) существенно дополнил биологическую классификацию. На сегодняшний день выделяют 5 родительских штаммов PVY, среди которых для картофеля обычно характерны штаммы N и O. Кроме того, существуют различные рекомбинантные варианты, появившиеся в результате обмена участками геномов родительских штаммов между собой (NTN, N:O, N-Wi и др.). Описанные варианты имеют 1-4 точки рекомбинации между O- и N-геномами и обладают значительным преимуществом перед родительскими штаммами (17). Уже в начале 2000-х годов в Европе и Америке рекомбинанты составляли половину всех выявленных изолятов PVY (3). Наиболее распространены группы штаммов NO и NTN. В настоящее время в базе данных NCBI содержится около 900 последовательностей полных геномов вируса Y штаммов, собранных с разных растений-хозяев из разных стран, что свидетельствует о значительном интересе к нему.

Другой потивирус — PVA менее распространен в силу того, что большинство современных сортов обладают генами устойчивости *Na* и *NaKE*, поэтому PVA менее изучен, чем PVY, хотя он также представляет собой один из самых старых вирусов, попавших в Европу вместе с картофелем (19). Филогенетический анализ полногеномных последовательно-

стей позволил выделить три филогруппы — А (андийская; большинство изолятов были выделены из диких и полудиких видов картофеля, произрастающих преимущественно в Перуанских Андах, однако один из изолятов был выделен из культурного тетраплоидного картофеля), W (самая большая группа, изоляты которой выделяли из растений картофеля с разных континентов) и Т (изоляты, выделенные из растений томарилло *Syphomandra betacea*, произрастающих в Новой Зеландии).

Второй по изученности вирус картофеля — PVX, занимающий 10 место в топ-10 самых важных вирусов растений не только из-за его экономического эффекта, но и как один из основных модельных объектов изучения взаимодействия вирус-растение (14). Особый интерес PVX представляет как вектор для экспрессии белков в растениях как в роли биофабрики (20, 21), так и для доставки компонентов системы редактирования генома CRISPR/Cas9 (22). Основными растениями-хозяевами PVX служат картофель, томат и табак, хотя он и встречается на растениях других семейств (23). Исходно с помощью растений картофеля, обладающих генами устойчивости *Nx* и *Nb*, было выделено четыре биологических штамма PVX. По результатам анализа последовательностей белка оболочки вируса было выделено две основные филогруппы (I и II) и три подгруппы: II-1, II-2 и II-3 (24, 25). Изоляты PVX-I распространены по всему миру, тогда как PVX-II-1 встречались в Европе, а PVX-II-2 и PVX-II-3 — в Америке. Однако выделенные филогруппы плохо коррелируют с биологическими штаммами. Так, штамм 4, преодолевающий оба гена устойчивости, встречался в обеих филогруппах. Филогенетический анализ полногеномных последовательностей (26) хорошо согласуется с результатами анализа последовательностей белка оболочки. Дополнительно были выделены подгруппы I-1 и I-2. Рекомбинантный анализ (26) позволил выявить изоляты, которые с большой долей вероятности представляют собой рекомбинантные варианты между геномами I и II филогрупп. Родственный вирус PAMV также встречается по всему миру, но очень редко из-за того, что генотипы картофеля, восприимчивые к нему, уже широко не выращиваются (2, 27). Однако он спорадически встречается на других растениях (28).

Вирус картофеля S — один из самых распространенных и вредных вирусов картофеля. PVS исходно разделяли на два штамма — PVS^O и PVS^A по способности вызывать системную инфекцию у растения-индикатора *Chenopodium quinoa* (29). Филогенетический анализ на основе последовательностей белка оболочки показал наличие двух филогрупп, которые попытались соотнести с уже выделенными штаммами. Однако анализ последовательностей геномов PVS значительного количества изолятов показал, что способность вызывать реакцию у *C. quinoa* не зависела от принадлежности к филогруппе. Для того чтобы отразить биологические особенности конкретных изолятов выявленных филогрупп, были введены обозначения PVS^{O-CS} для изолятов PVS^O, которые могли вызывать системную реакцию, и PVS^{A-CL} для изолятов PVS^A, которые ее не вызывали. Кроме того, были найдены изоляты PVS, которые объединили в новую филогруппу PVS^{RVC} (29, 30). В конце концов, чтобы избежать путаницы с биологически выделенными штаммами, было предложено обозначить филогруппы как PVS^I, PVS^{II} и PVS^{III}, которые достаточно хорошо охарактеризованы (29, 31, 32). В отличие от PVY, у PVS рекомбинантные варианты встречаются гораздо реже. Тем не менее, описано 9 вариантов, выявленных среди 139 изученных изолятов (32).

Для остальных вирусов картофеля, даже распространенных и эко-

номически значимых, исследований по биоразнообразию практически нет. Одна из причин этого — небольшое число изолятов, для которых доступны полногеномные последовательности (см. табл.), причем зачастую изоляты для секвенирования собираются в ограниченном числе регионов. Например, для PLRV большинство изолятов происходит из Кении (33).

Наиболее распространенные методы лабораторной диагностики вирусов картофеля. Несмотря на то, что некоторые вирусные заболевания картофеля сопровождаются яркими симптомами и могут быть выявлены визуально, существует необходимость в лабораторной диагностике. Наличие и выраженность симптомов зависит от штамма вируса, сорта картофеля, вирусной нагрузки и условий окружающей среды. Вирусные инфекции, даже не имеющие ярко выраженных симптомов в виде некрозов или деформации листьев, все равно могут вызывать существенное снижение урожая (34). История возникновения разных методов диагностики вирусов растений подробно рассмотрена в работе F. Maclot с соавт. (35), поэтому здесь будут приведены сведения только о наиболее используемых подходах.

Диагностика может быть направлена на детекцию вирусных белков или нуклеиновых кислот в растении. В первом случае используются серологические методы, такие как иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA, Enzyme Linked Immunosorption Assay) или иммунохроматографический анализ (ИХА). Эти подходы основаны на узнавании какого-либо вирусного белка (обычно белка оболочки вируса) с помощью специфичных антител с последующей детекцией полученного комплекса. Достоинствами этих подходов — относительная дешевизна, скорость и простота. Кроме того, существуют полевые варианты, которые позволяют проводить экспресс-тест без специального оборудования. Для успешной детекции вируса с помощью ИФА требуется накопление достаточно большого количества вирусного белка в растении. С одной стороны, это уменьшает вероятность контаминации между образцами, с другой растения с небольшой вирусной нагрузкой, например на ранних стадиях заражения, дадут ложно-отрицательный результат. Для вируса PVY существуют ИФА наборы, которые позволяют различить основные штаммы — О, N и С, однако обычно они не дают возможности идентифицировать рекомбинантные штаммы, относя их к одному из родительских (15). Для других вирусов картофеля не существует тест-систем для определения штаммового состава, основанных на серологических методах.

Для детекции нуклеиновых кислот вирусов могут использоваться разнообразные варианты полимеразной цепной реакции (ПЦР) со специфическими праймерами. Поскольку геном большинства вирусов картофеля представлен молекулами РНК, то перед проведением ПЦР требуется дополнительный этап обратной транскрипции для синтеза ДНК. Существуют разные модификации ПЦР, применяемые для детекции вирусов картофеля (36), однако наиболее часто используются ПЦР в реальном времени (RT-PCR, real-time PCR, ОТ-ПЦР-РВ) или количественная ПЦР (qPCR, quantitative PCR), благодаря высокой чувствительности и возможности мультиплексирования для одновременной детекции нескольких вирусов или штаммов одного вируса (37, 38). Кроме того, количественная ПЦР позволяет приблизительно оценить вирусную нагрузку. В то же время при использовании ПЦР существует опасность ложно положительных результатов из-за контаминаций при сборе образцов или подготовке реакционной смеси (36).

Из-за накапливающихся мутаций и/или рекомбинаций в вирусных

генах возможно появление изолятов, которые нельзя детектировать с помощью применяемых праймеров или антител. Кроме того, тестирование такими методами дает информацию только о тех вирусах, которые ищут целенаправленно, но не обо всех, которые можно инфицировать в том же самом растении. Комплексное выявление вирусов в растениях, в том числе неизвестных ранее, возможно только с помощью высокопроизводительного секвенирования. Выделяют две группы подходов: NGS (next generation sequencing, секвенирование следующего поколения), также известное как секвенирование коротких фрагментов, и TGS (third-generation sequencing, секвенирование третьего поколения), известное как секвенирование длинных прочтений. Существует множество обзоров, например К.Р. Kumar с соавт. (39), авторы которых сравнивают разные технологии секвенирования, поэтому в настоящем разделе они рассматриваются только в общем виде.

NGS-технологии, разработанные на платформах Illumina, Ion Torrent и других, успешно используются в диагностике вирусов растений уже достаточно давно (40, 41). В зависимости от конкретной платформы этапы анализа могут различаться, но все они будут включать в себя: выделение РНК из исследуемого растения (поскольку большая часть вирусов картофеля относятся к РНК-содержащим) и обратная транскрипция для синтеза кДНК; приготовление библиотеки фрагментов кДНК длиной 100-600 нуклеотидов и клонирование амплификации для получения необходимого количества копий; секвенирование; биоинформатический анализ и выявление вирусных последовательностей.

С использованием таких подходов изучали виromы картофеля в разных странах (42-45), успешно диагностируя новые виды вирусов и оценивая локальное генетическое разнообразие. Однако из-за секвенирования коротких фрагментов могут возникать проблемы с корректной сборкой геномов рекомбинантных штаммов при недостаточно высоком покрытии. Не так давно ставшие популярными технологии длинных прочтений на платформах Pacific Bioscience (PacBio) и Oxford Nanopore Technology (ONT) также позволяют получить большое количество прочтений с одного образца. Секвенирование индивидуальных длинных молекул позволяет «вместить» отдельный вирусный геном в одно прочтение. Это существенное преимущество при изучении рекомбинантных штаммов. Кроме того, для платформы ONT есть решения для прямого секвенирования РНК, которые позволяют избежать стадии обратной транскрипции. Главный недостаток платформ PacBio — высокая стоимость анализа, поэтому ONT секвенирование для изучения вирусов растений применяется более широко (46), в том числе была опубликована работа по диагностике вирусов картофеля с помощью ONT секвенирования (47). Особенно этот подход оказался полезным при анализе растений, зараженных изолятами PVY, относящимися к разным рекомбинантным штаммам.

Отдельно стоит остановиться на подходах к диагностике вириодов, которые также способны инфицировать картофель, в основном это вириод веретеновидности клубней PSTVd. Вириоды — это инфекционные агенты растений, состоящие из одноцепочечной неинкапсулированной молекулы РНК размером 246-401 нуклеотид, которая образует различные вторичные структуры, но не кодирует белки, поэтому серологические методы для детекции вириодов неприменимы (48). Альтернативой служит гибридизация нуклеиновых кислот с помощью специфичных РНК- или ДНК-зондов с последующей детекцией комплекса. Такие методы до последнего времени использовались достаточно широко, но они слишком трудоемки для ру-

тинного применения (49), поэтому постепенно уступают место диагностике, основанной на РТ-ПЦР, которая к тому же гораздо более чувствительна в формате ОТ-ПЦР-РВ (50). Однако именно высокопроизводительное секвенирование позволило существенно продвинуться как в описании новых вирионов, так и в характеристике биоразнообразия уже известных (51).

На сегодняшний день технологии высокопроизводительного секвенирования не применяются массово для диагностики и изучения вирусов картофеля из-за трудоемкости пробоподготовки и необходимости биоинформатического анализа, а также более дорогих реагентов по сравнению с ПЦР и ИФА. Тем не менее с развитием технологий и появлением новых платформ стоимость секвенирования одного образца неуклонно снижается (46). Кроме того, появляются новые алгоритмы и программы для выявления и идентификации вирусных последовательностей в транскриптомных данных (52-55), что упрощает и автоматизирует биоинформатический анализ. Поэтому с осторожным оптимизмом можно рассчитывать, что высокопроизводительное секвенирование скоро станет рутинным методом мониторинга вирусов картофеля.

Взаимодействие вирусов при ко-инфекции. Многие растительные вирусы способны поражать большое число хозяев, кроме того, насекомые-переносчики часто оказываются полифагами и одновременно переносят разные вирусы между растениями. Вследствие этого одно растение зачастую инфицировано разными вирусами. Присутствие разных вирусов в одном растении подтверждается исследованиями растительных вирионов с помощью методов высокопроизводительного секвенирования, однако исследований, изучающих влияние разных вирусов друг на друга при смешанных инфекциях, было не так много. Взаимодействие вирусов внутри растения-хозяина может характеризоваться синергизмом (как минимум один вирус имеет преимущество в развитии по сравнению с моноинфекцией), антагонизмом (один или оба вируса развиваются хуже) и нейтральностью (нет изменений в динамике развития обоих вирусов) (34).

Было показано, что взаимодействие PVY и PVX увеличивает накопление частиц обоих вирусов и проявление симптомов на *Nicotiana tabacum* и *N. benthamiana* (56, 57). Присутствие PVX существенно увеличивало титр PVS на разных сортах картофеля и усиливало проявление симптомов, но при этом количество самого PVX не изменялось (58). Вирус PVA сам по себе практически не вызывает симптомов у *N. benthamiana*. Инфекция PVX влияет на морфологические характеристики — высоту растения, площадь листьев, компактность. Смешанная инфекция PVA и PVX приводит к значительным изменениям как морфологии, так и метаболизма растений, включая температуру листьев и интенсивность фотосинтеза (59, 60).

Взаимодействие вирусов может проявиться не только на уровне организма растения, но и на уровне векторов. Например, вирус PLRV, по-видимому, не повышает титры вирусов при смешанных инфекциях с разными вирусами на растениях *Solanum brevidens*, *N. benthamiana* и *N. Cleveandii*. Однако было сообщено о том, что смешанная инфекция картофеля PVY+PLRV влияет на плодовитость и поведение двух видов тлей (61). Другим примером синергизма может быть использование новых векторов для передачи между растениями. Так, вирион PSTVd может распространяться контактно и через зараженные семена, возможна передача за счет других патогенов (62), но не с тлями. Тем не менее при смешанной инфекции вирион способен инкапсулироваться в вирусный капсид и передаваться с помощью тлей (63). Основной способ передачи PVX между растениями — контактный (64), он распространен достаточно широко, но

обычно встречается именно в смешанных инфекциях с другими вирусами. Можно предположить, что PVX использует белки других вирусов для передачи с насекомыми по аналогии с PAMV, который также относится к роду *Potexvirus* и не способен передаваться с помощью тлей. Показано, что в присутствии PVY или его белка HC-Pro PAMV приобретает способность передаваться с тлями (65).

Интересным вариантом антагонистического взаимодействия вирусов является кросс-защита, когда присутствие одного вируса делает невозможным заражение другим. В случае мягких симптомов первого вируса его можно использовать в качестве «вакцины» для защиты растений от более агрессивных штаммов. Например, мутантные изоляты PVY, не вызывающие симптомов и неспособные взаимодействовать с тлями, могут защищать растения от агрессивных природных штаммов (66). Однако пока молекулярные механизмы взаимодействия вирусов между собой, с растениями-хозяевами и векторами остаются малоизученными, сложно говорить об осознанном применении кросс-защиты против широкого спектра вирусов.

Исследования вирусов картофеля в России. В России картофель выращивается во всех регионах (рис. 1). Площадь, занятая посадками картофеля в 2023 году, составила 1009 тыс. га (см. дополнительные материалы на сайте <http://www.agrobiology.ru>).




Рис. 1. Регионы России, для которых Росстатом учитывались посевные площади картофеля (тыс. га) в 2023 году (<https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13277#>): ИФА — иммуноферментный анализ, ОТ-ПЦР — ПЦР с обратной транскрипцией, ОТ-ПЦР-РВ — ПЦР в реальном времени. Выделение штриховкой отражает наличие хотя бы одного случая нахождения вирусов картофеля в области тем или иным методом.

Почти треть этой территории (308 тыс. га) сосредоточена в Центральном федеральном округе, где лидирует Брянская область (48,037 тыс. га). Немногим меньше (271 тыс. га) пришлось на Приволжский федеральный округ, где лидировали Республика Татарстан (44,08915 тыс. га) и Республика Башкортостан (41,9414 тыс. га).

На основании данных Росстата за 2023 год (см. рис. 1), медианным значением по регионам России, для которых были собраны данные по площадям выращивания картофеля, — 9,5834 тыс. га. При производстве семенного картофеля, который далее идет в промышленное выращивание, согласно ГОСТ 33996-2016 (67) необходимо тестировать семенной материал

на отсутствие PVY, PVA, PVS, PVM, PVX, PLRV и вириода PSTVd, кроме того, рекомендуется проверка на вирусы PMTV и TRV. Эти вирусы относятся к повсеместно распространенным на картофеле и многие из них наносят ощутимый урон урожаю, поэтому неудивительно именно они попали в ГОСТы и что в большинстве опубликованных исследований использовались тест-системы, специфичные именно для этих вирусов. К допустимым методам диагностики относятся ИФА, ИХА и ПЦР (67, 68).

В России все эти подходы для оценки семенного материала используются достаточно давно и широко (69), в том числе разрабатываются тест-системы для диагностики (70-72). Первые публикации в рецензируемых журналах по исследованию распространения вирусов картофеля в России с применением методов лабораторной диагностики появились около 15 лет назад, когда с использованием ИФА исследовали распространение вирусов в Самарской (73, 74) и Карельской (75) областях. Далее изучение продолжалось с помощью как ИФА (76-79), так и методов на основе ПЦР (72, 80-88).




Рис. 2. Число случаев детекции вирусов картофеля с помощью лабораторных методов диагностики для каждого федерального округа Российской Федерации на основе работ, опубликованных в рецензируемых журналах (80-91): ФО — федеральный округ, Ю — Южный, СЗ — Северо-Западный, ДВ — Дальневосточный, Ц — Центральный, П — Приволжский, С — Сибирский, СК — Северо-Кавказский, У — Уральский; PVY — Potato virus Y, PVX — Potato virus X, PVS — Potato virus S, PVA — Potato virus A, PVM — Potato virus M, PLRV — Potato leafroll virus, PVP — Potato virus P, PMTV — Potato top-mot virus, AMV — Alfalfa mosaic virus, PSTVd — Potato spindle tuber viroid. Работы, использованные для описания, представлены в дополнительных материалах на сайте <http://www.agrobiology.ru>.

В ДВФО и СФО (рис. 2, дополнительные материалы на сайте <http://www.agrobiology.ru>) наиболее часто идентифицировали PVS, однако в большинстве округов в случаях выявления вирусов преобладал PVY. Регистрировали смешанные инфекции (72, 88), иногда по трем или четырем вируса одновременно (79). В некоторых работах исследовался и штаммовый состав популяций PVY, в том числе отмечали присутствие разных рекомбинантных штаммов в одном растении (81-83). С одной стороны, PVY действительно очень распространен, с другой — с помощью специфических

тест-систем детектируется только искомый вирус. На рисунке 1 штриховкой выделены области, где хотя бы один раз с помощью лабораторных методов диагностики был зарегистрирован хотя бы один вирус. К сожалению, скорее всего, это говорит о недостатке исследований, касающихся распространения вирусов, а не об очень здоровом картофеле в незаштрихованных областях. Помимо этого, не наблюдается прямой зависимости между площадями выращивания картофеля и количеством выявленных вирусов, например, в Брянской области, которая в 2023 году стала лидером.

Как уже отмечалось, в опубликованных работах в основном специфично изучались наиболее распространенные вирусы, поэтому истинное биоразнообразие вирусов остается скрытым. Тем не менее было сообщение о находке AMV в Татарстане на картофеле (89). В последние годы появились исследования с использованием высокопроизводительных методов. Так был обнаружен вирус PVP (90). Интересно, что за пределами Южной Америки он был зарегистрирован впервые. Анализ генома изолята PVP из Приморского края показал, что он сильно отличается от изолятов из Бразилии и Аргентины. В дальнейшем эта же группа, уже с использованием ПЦР-подхода показала, что PVP встречается в России в разных регионах (81). Также с помощью высокопроизводительного секвенирования изучались виromы в нескольких коммерческих посадках картофеля в Московской и Астраханской областях. В основном регистрировался PVY, однако встречались и вирусы PVS и PVM. Одним из самых интересных результатов стала характеристика рекомбинантных штаммов PVY, которую было бы затруднительно получить с помощью других подходов. В том числе были выявлены новые, ранее не описанные в мире рекомбинантные варианты PVY (91, 92).

Итак, одной из сложностей при изучении биоразнообразия вирусов картофеля становится большая площадь территорий в разных регионах Российской Федерации, на которых выращивается эта культура. При этом список рутинно диагностируемых вирусов картофеля не изменяется на протяжении многих лет, что не всегда отражает реальную ситуацию. Так, оставшийся длительное время актуальным вирус PVA в настоящее время встречается все реже, тогда как появление рекомбинантных вариантов PVY в свое время повысило его значимость. Однако широкое культивирование сортов, устойчивых к вирусу Y, может в обозримом будущем снизить его актуальность. Возможны ситуации, когда вирусы, характерные для локальной флоры, смогут адаптироваться к картофелю. Для своевременного мониторинга вирусных инфекций требуются подходы, которые способны комплексно выявлять новые для нашей страны вирусные инфекции и актуализировать список диагностируемых вирусов. Развитие методов высокопроизводительного секвенирования сделало их относительно доступными для изучения биоразнообразия вирусов растений и диагностики вирусных инфекций в ряде стран. В последние годы этот подход начинает применяться и в России, что позволило охарактеризовать штаммовый состав PVY в некоторых областях и идентифицировать ранее никогда не встречавшийся в России вирус PVP. Большинство исследованных ранее образцов картофеля происходили из коммерческих посадок. Расширение охвата исследований за счет личных подсобных хозяйств, на долю которых приходится три четверти выращиваемого картофеля, позволит получить больше информации о распространенности вирусных инфекций на территории России.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахатов А.К., Ганнибал Ф.Б., Мешков Ю.И., Джалилов Ф.С., Чижов В.Н., Игнатов А.Н., Полищук В.П., Шевченко Т.П., Борисов Б.А., Стройков Ю.М., Белошапкина О.О. *Болезни и вредители овощных культур и картофеля*. М., 2013.
2. Kreuze J.F., Souza-Dias J.A.C., Jeevalatha A., Figueira A.R., Valkonen J.P.T., Jones R.A.C. Viral diseases in potato. In: *The potato crop* /Campos H., Ortiz O. (eds.). Springer, New York, NY, 2020: 389-430.
3. Quenouille J., Vassilakos N., Moury B. Potato virus Y. *Molecular Plant Pathology*, 2013, 14(5): 439-452 (doi: 10.1111/mpp.12024).
4. Lin Y.H., Johnson D.A., Pappu H.R. Effect of Potato virus S infection on late blight resistance in potato. *American Journal of Potato Research*, 2014, 91(6): 642-648 (doi: 10.1007/s12230-014-9394-8).
5. Petek M., Rotter A., Kogovšek P., Baebler S., Mithöfer A., Gruden K. Potato virus Y infection hinders potato defence response and renders plants more vulnerable to Colorado potato beetle attack. *Molecular Ecology*, 2014, 23(21): 5378-5391 (doi: 10.1111/mec.12932).
6. Harahagazwe D., Condori B., Barreda C., Bararyenya A., Byarugaba A., Kude D., Lungaho C., Martinho C., Mbirri D., Nasona B., Ochieng B., Onditi J., Randrianaivoarivony J., Tankou C., Worku A., Schulte-Geldermann E., Mares V., Mendiburu F., Quiroz R. How big is the potato (*Solanum tuberosum* L.) yield gap in Sub-Saharan Africa and why? A participatory approach. *Open Agriculture*, 2018, 3(1): 180-189 (doi: 10.1515/opag-2018-0019).
7. Jones R.A.C. Plant virus ecology and epidemiology: historical perspectives, recent progress and future prospects. *Annals of Applied Biology*, 2014, 164(3): 320-347 (doi: 10.1111/aab.12123).
8. *Potato FAO/IPGRI technical guidelines for the safe movement of germplasm, no 19* /Diekmann M., Putter T. (eds.). FAO, Rome, 1998.
9. *Virus and virus-like diseases of potatoes and production of seed-potatoes* /Loebenstein G., Berger P., Brunt A., Lawson R. (eds.). Springer Dordrecht, 2001.
10. Ермак М.В., Мащишина Н.В. Картофельная коровка *Henosepilachna vigintioctomaculata* (Motsch.): систематика, морфология и ее вредоносность (литературный обзор). *Овощи России*, 2022, 6: 97-103 (doi: 10.18619/2072-9146-2022-6-97-103).
11. Sobko O.A. On the vector properties of *Henosepilachna vigintioctomaculata* Motschulsky, 1858 (Coleoptera: Coccinellidae) in the transmission of potato viruses. *Far Eastern Entomologist*, 2024, 501: 17-24.
12. Palukaitis P. Chrysanthemum stunt viroid. In: *Viroids and satellites* /Hadidi A., Flores R., Randles J.W., Palukaitis P. (eds.). Academic Press, Cambridge, 2017: 181-190.
13. Matsushita Y., Yanagisawa H., Khiutti A., Mironenko N., Ohto Y., Afanasenko O. First report of chrysanthemum stunt viroid isolated from potato (*Solanum tuberosum*) plants in Russia. *Journal of General Plant Pathology*, 2019, 85: 311-313 (doi: 10.1007/s10327-019-00851-z).
14. Scholthof K.B., Adkins S., Czosnek H., Palukaitis P., Jacquot E., Hohn T., Hohn B., Saunders K., Candresse T., Ahlquist P., Hemenway C., Foster G.D. Top 10 plant viruses in molecular plant pathology. *Molecular Plant Pathology*, 2011, 12(9): 938-954 (doi: 10.1111/j.1364-3703.2011.00752.x).
15. Karasev A.V., Gray S.M. Continuous and emerging challenges of Potato virus Y in potato. *Annual Review of Phytopathology*, 2013, 51: 571-586 (doi: 10.1146/annurev-phyto-082712-102332).
16. Gibbs A.J., Ohshima K., Yasaka R., Mohammadi M., Gibbs M.J., Jones R.A.C. The phylogenetics of the global population of potato virus Y and its necrogenic recombinants. *Virus Evolution*, 2017, 3(1): 002 (doi: 10.1093/ve/vex002).
17. Green K.J., Brown C.J., Gray S.M., Karasev A.V. Phylogenetic study of recombinant strains of Potato virus Y. *Virology*, 2017, 507: 40-52 (doi: 10.1016/j.virol.2017.03.018).
18. Green K.J., Brown C.J., Karasev A.V. Genetic diversity of potato virus Y (PVY): sequence analyses reveal ten novel PVY recombinant structures. *Archives of Virology*, 2018, 163: 23-32 (doi: 10.1007/s00705-017-3568-x).
19. Fuentes S., Gibbs A.J., Adams I., Wilson C., Botermans M., Fox A., Kreuze J., Boonham N., Kehoe M.A., Jones R.A.C. Potato virus A isolates from three continents: their biological properties, phylogenetics, and prehistory. *Phytopathology*, 2021, 111(1): 217-226 (doi: 10.1094/PHYTO-08-20-0354-FI).
20. Ravin N.V., Mardanova E.S., Kotlyarov R.Y., Novikov V.K., Atabekov J.G., Skryabin K.G. Complete sequencing of potato virus X new strain genome and construction of viral vector for production of target proteins in plants. *Biochemistry*, 2008, 73(1): 44-49 (doi: 10.1134/s0006297908010069).
21. Canizares M.C., Nicholson L., Lomonosoff G.P. Use of viral vectors for vaccine production in plants. *Immunology and Cell Biology*, 2005, 83(3): 263-270 (doi: 10.1111/j.1440-1711.2005.01339.x).
22. Ariga H., Toki S., Ishibashi K. Potato virus X vector-mediated DNA-free genome editing in plants. *Plant & Cell Physiology*, 2020, 61(11): 1946-1953 (doi: 10.1093/pcp/pcaa123).
23. Esfandiari N., Kohi-Habibi M., Hohn T., Pooggin M. Complete genome sequence of an Irani-

- an isolate of Potato virus X from the legume plant *Pisum sativum*. *Virus Genes*, 2009, 39: 141-145 (doi: 10.1007/s11262-009-0371-0).
24. Kutnjak D., Silvestre R., Cuellar W., Perez W., Müller G., Ravnikar M., Kreuze J. Complete genome sequences of new divergent potato virus X isolates and discrimination between strains in a mixed infection using small RNAs sequencing approach. *Virus Research*, 2014, 191: 45-50 (doi: 10.1016/j.virusres.2014.07.012).
 25. Cox B.A., Jones R.A. Genetic variability in the coat protein gene of Potato virus X and the current relationship between phylogenetic placement and resistance groupings. *Archives of Virology*, 2010, 155(8): 1349-1356 (doi: 10.1007/s00705-010-0711-3).
 26. Fuentes S., Gibbs A.J., Hajizadeh M., Perez A., Adams I.P., Fribourg C.E., Kreuze J., Fox A., Boonham N., Jones R.A.C. The phylogeography of Potato virus X shows the fingerprints of its human vector. *Viruses*, 2021, 13: 644 (doi: 10.3390/v13040644).
 27. Wu X., Liu Q., Chai M., Liu J., Zhang L., Cheng X. First report of potato aucuba mosaic virus on potato in China. *Plant Disease*, 2018, 102(12): 2671-2671 (doi: 10.1094/PDIS-05-18-0851-PDN).
 28. Fox A., Fowkes A., Buxton-Kirk A., Jackson L., Forde S., Ward R., MacIvor A., Harju V., Skelton A. Adams I. First report of Potato aucuba mosaic virus in *Solanum jasminoides* in the United Kingdom. *New Disease Reports*, 2016, 34(1): 32-32 (doi: 10.5197/j.2044-0588.2016.034.032).
 29. Santillan F.W., Fribourg C.E., Adams I.P., Gibbs A.J., Boonham N., Kehoe M.A., Maina S., Jones R.A.C. The biology and phylogenetics of Potato virus S isolates from the Andean region of South America. *Plant Disease*, 2018, 102(5): 869-885 (doi: 10.1094/PDIS-09-17-1414-RE).
 30. Duan G., Zhan F., Du Z., Ho S.Y.W., Gao F. Europe was a hub for the global spread of potato virus S in the 19th century. *Virology*, 2018, 525: 200-204 (doi: 10.1016/j.virol.2018.09.022).
 31. Jones R.A., Kehoe M.A. A proposal to rationalize within-species plant virus nomenclature: benefits and implications of inaction. *Archives of Virology*, 2016, 161(7): 2051-2057 (doi: 10.1007/s00705-016-2848-1).
 32. Topkaya Ş., Çelik A., Santosa A.I., Jones R.A.C. Molecular analysis of the global population of Potato virus S redefines its phylogeny, and has crop biosecurity implications. *Viruses*, 2023, 15(5): 1104 (doi: 10.3390/v15051104).
 33. Farooq T., Hussain M., Shakeel M., Riaz H., Waheed U., Siddique M., Shahzadi I., Aslam M., Tang Y., She X., He Z. Global genetic diversity and evolutionary patterns among Potato leafroll virus populations. *Frontiers in Microbiology*, 2022, 13: 1022016 (doi: 10.3389/fmicb.2022.1022016).
 34. Moreno A.B., López-Moya J.J. When viruses play team sports: mixed infections in plants. *Phytopathology*, 2020, 110(1): 29-48 (doi: 10.1094/PHYTO-07-19-0250-FI).
 35. Maclot F., Candresse T., Filloux D., Malmstrom C.M., Roumagnac P., van der Vlugt R., Massart S. Illuminating an ecological blackbox: using high throughput sequencing to characterize the plant virome across scales. *Frontiers in Microbiology*, 2020, 11: 578064 (doi: 10.3389/fmicb.2020.578064).
 36. Kumar R., Tiwari R.K., Kaundal P., Sharma S., Chakrabarti S. Potato viruses and their diagnostic techniques: an overview. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 2019, 8(6): 1932-1944.
 37. Prinz M., Kellermann A., Bauch G., Hadersdorfer J., Stammler J. Development of the first PVM TaqMan® primer set and a one-step real-time multiplex DiRT-PCR for the detection of PLRV, PVY, PVM, PVS, PVA and PVX in potato tuber sap. *European Journal of Plant Pathology*, 2022, 162: 807-823 (doi: 10.1007/s10658-021-02436-z).
 38. Rashid M., Li J., Liu Q., Wang Y., Han C. Molecular detection and identification of eight potato viruses in Gansu province of China. *Current Plant Biology*, 2021, 25: 100184 (doi: 10.1016/j.cpb.2020.100184).
 39. Kumar K.R., Cowley M.J., Davis R.L. Next-generation sequencing and emerging technologies. *Seminars in Thrombosis and Hemostasis*, 2019, 45(07): 661-673 (doi: 10.1055/s-0039-1688446).
 40. Adams I., Glover R., Monger W., Mumford R., Jackeviciene E., Navalinskiene M., Samutiene M., Boonham N. Next-generation sequencing and metagenomic analysis: a universal diagnostic tool in plant virology. *Molecular Plant Pathology*, 2009, 10(4): 537-545 (doi: 10.1111/j.1364-3703.2009.00545.x).
 41. Stobbe A.H., Roossinck M.J. Plant virus metagenomics: what we know and why we need to know more. *Frontiers in Plant Science*, 2014, 5: 150 (doi: 10.3389/fpls.2014.00150).
 42. Cardenas H.M., Sanchez P.G., Montoya M.M. Detection and sequencing of Potato virus Y (PVY) and Potato leafroll virus (PLRV) in a volunteer plant of *Solanum tuberosum* L. cv. Diacol-Capiro. *Acta Agronomica*, 2017, 66: 4 (doi: 10.15446/acag.v66n4.59753).
 43. Avrahami-Moyal L., Tam Y., Sela N., Prakash S., Meller Harel Y., Bornstein M., Shulchani R., Dar Z., Gaba V. Characterization of potato virus Y populations in potato in Israel. *Archives of virology*, 2019, 164: 1691-1695 (doi: 10.1007/s00705-019-04250-9).
 44. Alinda A.K., Okoth P.K., Onamu R., Read D., Genevieve T., Muoma J.O. Next generation sequencing platforms for potato virus hunting, surveillance and discovery. *African Journal of*

- Bacteriology Research*, 2020, 12(1): 1-11.
45. Sierra A., Gallo Y., Estrada M., Gutiérrez P., Marín M. Detection of four RNA viruses in commercial and informal potato seed tubers in Antioquia (Colombia). *Archives of Phytopathology and Plant Protection*, 2020, 54(5-6): 273-294 (doi: 10.1080/03235408.2020.1829424).
 46. Liefing L.W., Waite D.W., Thompson J.R. Application of oxford nanopore technology to plant virus detection. *Viruses*, 2021, 13(8): 1424 (doi: 10.3390/v13081424).
 47. Della Bartola M., Byrne S., Mullins E. Characterization of Potato virus Y isolates and assessment of nanopore sequencing to detect and genotype potato viruses. *Viruses*, 2020, 12(4): 478 (doi: 10.3390/v12040478).
 48. Steger G., Riesner D. Viroid research and its significance for RNA technology and basic biochemistry. *Nucleic Acids Research*, 2018, 46(20): 10563-10576 (doi: 10.1093/nar/gky903).
 49. Gucek T., Trdan S., Jakse J., Javornik B., Matousek J., Radisek S. Diagnostic techniques for viroids. *Plant Pathology*, 2017, 66(3): 339-358 (doi: 10.1111/ppa.12624).
 50. Boonham N., Perez L.G., Mendez M.S., Peralta E.L., Blockley A., Walsh K., Barker I., Mumford R.A. Development of a real-time RT-PCR assay for the detection of potato spindle tuber viroid. *Journal of Virological Methods*, 2004, 116(2): 139-146 (doi: 10.1016/j.jviromet.2003.11.005).
 51. Adkar-Purushothama C.R., Perreault J.P. Impact of nucleic acid sequencing on viroid biology. *International Journal of Molecular Sciences*, 2020, 21(15): 5532 (doi: 10.3390/ijms21155532).
 52. Zheng Y., Gao S., Padmanabhan C., Li R., Galvez M., Gutierrez D., Fuentes S., Ling K.-S., Kreuze J., Fei Z. VirusDetect: an automated pipeline for efficient virus discovery using deep sequencing of small RNAs. *Virology*, 2017, 500: 130-138 (doi: 10.1016/j.virol.2016.10.017).
 53. Flygare S., Simmon K., Miller C., Qiao Y., Kennedy B., Di Sera T., Graf E.H., Tardif K.D., Kapusta A., Rynearson S., Stockmann C., Queen K., Tong S., Voelkerding K.V., Blaschke A., Byington C.L., Jain S., Pavia A., Ampofo K., Eilbeck K., Schlager R. Taxonomer: an interactive metagenomics analysis portal for universal pathogen detection and host mRNA expression profiling. *Genome Biology*, 2016, 17(1): 111 (doi: 10.1186/s13059-016-0969-1).
 54. Antipov D., Raiko M., Lapidus A., Pevzner P.A. Metaviral SPAdes: assembly of viruses from metagenomic data. *Bioinformatics*, 2020, 36(14): 4126-4129 (doi: 10.1093/bioinformatics/btaa490).
 55. Barrero R.A., Napier K.R., Cunningham J., Liefing L., Keenan S., Frampton R.A., Szabo T., Bulman S., Hunter A., Ward L., Whattam M., Belgard M. An internet-based bioinformatics toolkit for plant biosecurity diagnosis and surveillance of viruses and viroids. *BMC Bioinformatics*, 2017, 18: 26 (doi: 10.1186/s12859-016-1428-4).
 56. Vance V.B. Replication of potato virus X RNA is altered in coinfections with potato virus Y. *Virology*, 1991, 182(2): 486-494 (doi: 10.1016/0042-6822(91)90589-4).
 57. Senanayake D.M.J.B., Mandal B. Expression of symptoms, viral coat protein and silencing suppressor gene during mixed infection of a N-Wi strain of Potato virus Y and an asymptomatic strain of Potato virus X. *Virus Disease*, 2014, 25: 314-321 (doi: 10.1007/s13337-014-0204-1).
 58. Nyalugwe E.P., Wilson C.R., Coutts B.A., Jones R.A.C. Biological properties of Potato virus X in potato: Effects of mixed infection. *Plant Disease*, 2012, 96(1): 43-54 (doi: 10.1094/PDIS-04-11-0305).
 59. De S., Chavez-Calvillo G., Wahlsten M., Mäkinen K. Disruption of the methionine cycle and reduced cellular glutathione levels underlie potex–potyvirus synergism in *Nicotiana benthamiana*. *Molecular Plant Pathology*, 2018, 19(8): 1820-1835 (doi: 10.1111/mpp.12661).
 60. Pollari M., Sipari N., Poque S., Himanen K., Mäkinen K. Effects of poty-potexvirus synergism on growth, photosynthesis and metabolite status of *Nicotiana benthamiana*. *Viruses*, 2023, 15(1): 121 (doi: 10.3390/v15010121).
 61. Srinivasan R., Alvarez J.M. Effect of mixed viral infections (potato virus Y-potato leafroll virus) on biology and preference of vectors *Myzus persicae* and *Macrosiphum euphorbiae* (Hemiptera: Aphididae). *Journal of Economic Entomology*, 2007, 100(3): 646-655.
 62. Afanasenko O.S., Khiutti A.V., Mironenko N.V., Lashina N.M. Transmission of potato spindle tuber viroid between *Phytophthora infestans* and host plants. *Vavilovskii Zhurnal Genetiki i Selektzii*, 2022, 26(3): 272-280 (doi: 10.18699/VJGB-22-34).
 63. Syller J., Marczewski W. Potato leafroll virus-assisted aphid transmission of potato spindle tuber viroid to potato leafroll virus-resistant potato. *Journal of Phytopathology*, 2008, 149(3-4): 195-201 (doi: 10.1046/j.1439-0434.2001.00600.x).
 64. Verchot J. Potato virus X: A global potato-infecting virus and type member of the Potexvirus genus. *Molecular Plant Pathology*, 2022, 23(3): 315-320 (doi: 10.1111/mpp.13163).
 65. Manoussopoulos I.N. Acquisition and retention of Potato virus Y helper component in the transmission of Potato aucuba mosaic virus by aphids. *Journal of Phytopathology*, 2001, 149: 103-106 (doi: 10.1046/j.1439-0434.2001.00580.x).
 66. Xu X.-J., Sun X.-J., Liu C.-J., Chen X.-Z., Zhu Q., Tian Y.-P., Li X.-D. Development of an attenuated potato virus Y mutant carrying multiple mutations in helper-component protease for cross-protection. *Virus Research*, 2024, 344: 199369 (doi: 10.1016/j.virusres.2024.199369).
 67. ГОСТ 33996-2016. Картофель семенной — технические условия и методы определения качества.

- Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. М., 2016.
68. ГОСТ 59551-2021. Картофель семенной — отбор проб и методы диагностики фитопатогенов. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. М., 2021.
69. Жевора С.В., Зейрук В.Н., Белов Г.Л., Васильева С.В., Деревягина М.К., Анисимов Б.В., Старовойтов В.И., Мишуrow Н.П., Неменушая Л.А., Манохина А.А., Пискунова Н.А. *Передовые методы диагностики патогенов картофеля*. М., 2019.
70. Рязанцев Д.Ю., Завриев С.К. Эффективный метод диагностики и идентификации вирусных патогенов картофеля. *Молекулярная биология*, 2009, 43(3): 558-567.
71. Сафенкова И.В., Панкратова Г.К., Жердев А.В., Зайцев И.А., Усков А.И., Варицев Ю.А., Дзантиев Б.Б. Разработка мультипараметрических иммуноаналитических тест-систем для выявления скрытой зараженности картофеля вирусными и бактериальными патогенами. *Защита картофеля*, 2014, 1: 60.
72. Malko A., Frantsuzov P., Nikitin M., Statsyuk N., Dzhavakhiya V., Golikov A. Potato pathogens in Russia's regions: an instrumental survey with the use of real-time PCR/RT-PCR in matrix format. *Pathogens*, 2019, 8(1): 18 (doi: 10.3390/pathogens8010018).
73. Прокофьев Л.С., Кинчарова М.Н. Оценка устойчивости к вирусным болезням и урожайности сортов картофеля в Среднем Поволжье. *Защита и карантин растений*, 2013, 5: 27-30.
74. Прокофьев Л.С., Кинчарова М.Н. Распространение, вредоносность и особенности проявления штаммов вируса PVY картофеля в лесостепи Среднего Поволжья. *Вестник защиты растений*, 2012, 3: 38-44.
75. Кузнецова Л.А., Евстратова Л.П. Вирусные болезни картофеля в Карелии. *Вестник российской академии сельскохозяйственных наук*, 2011, 2: 49-50.
76. Фоминых Т.С., Медведева К.Д. Вирусные болезни картофеля на Северо-Западе России. *Вестник защиты растений*, 2018, 4(98): 40-44 (doi: 10.31993/2308-6459-2018-4(98)-40-44).
77. Фоминых Т.С., Иванова Г.П., Медведева К.Д. Мониторинг вирусных болезней картофеля в Псковской и Астраханской областях России. *Вестник защиты растений*, 2017, 4(94): 29-34.
78. Шукин И.М., Пахомова Н.Г., Смирнов В.В. Зараженность растений картофеля вирусными болезнями в условиях Владимирского ополья. *Владимирский земледелец*, 2019, 3: 39-42 (doi: 10.24411/2225-2584-2019-10080).
79. Хайруллин Р.М., Гарифуллина Д.В., Веселова С.В., Черепанова Е.А., Максимов И.В. Пораженность картофеля вирусами в республике Башкортостан и активность рибонуклеаз. *Вестник защиты растений*, 2021, 104(4): 196-201 (doi: 10.31993/2308-6459-2021-104-4-15075).
80. Собко О.А., Фисенко П.В., Ким И.В., Мацшина Н.В. Зараженность 7 сортов картофеля вирусами в полевых условиях Приморского края РФ. *Овощи России*, 2022, 1: 79-85 (doi: 10.18619/2072-9146-2022-1-79-85).
81. Yanagisawa H., Matsushita Y., Khiutti A., Mironenko N., Ohto Y., Afanasenko O. Occurrence and distribution of viruses infecting potato in Russia. *Letters in Applied Microbiology*, 2021, 73(1): 64-72 (doi: 10.1111/lam.13476).
82. Усков А.И., Варицев Ю.А., Бирюкова В.А., Галушка П.А., Варицева Г.П., Шмыглы И.В., Кравченко Д.В. Изучение штаммового состава Y-вируса картофеля из различных регионов Российской Федерации и Беларуси. *Земледелие*, 2016, 8: 36-38.
83. Бирюкова В.А., Варицев Ю.А., Усков А.И., Шмыглы И.В., Галушка П.А., Варицева Г.П. Идентификация штаммов Y-вируса картофеля, выявленных в центральном регионе России. *Теоретические и прикладные проблемы Агропромышленного комплекса*, 2019, 4:19-24 (doi: 10.32935/2221-7312-2019-42-4-19-24).
84. Печенкина В.А., Боронникова С.В. Зараженность вирусами X и Y посадочного материала сортов картофеля (*Solanum tuberosum* L.), выращиваемых в Пермском крае. *Бюллетень науки и практики*, 2020, 6(5): 203-210 (doi: 10.33619/2414-2948/54/24).
85. Григорян М.А., Ткаченко О.В. Получение оздоровленного картофеля и диагностика вирусных заболеваний в условиях Энгельского района Саратовской области. *Аграрная наука*, 2019, 3: 60-63 (doi: 10.32634/0869-8155-2019-326-3-60-63).
86. Шляхов В.А., Григорян Л.Н. Идентификация вирусных болезней картофеля методом ПЦР-диагностики на территории Астраханской области. *Живые и биокостные системы*, 2017, 21: 6.
87. Стахеев А.А., Усков А.И., Варицев Ю.А., Галушка П.А., Ускова Л.Б., Жевора С.В., Завриев С.К. Изучение изолятов Y-вируса картофеля, распространенных на территории различных регионов Российской Федерации, с использованием новых молекулярных маркеров. *Земледелие*, 2023, 6: 37-40 (doi: 10.24412/0044-3913-2023-6-37-40).
88. Масленникова В.С., Пыхтина М.Б., Табанюхов К.А., Шелихова Е.В., Мосалев К.И., Катохин А.В., Бондарь А.А., Беклемишев А.Б., Воевода М.И. Распространенность и видовой состав вирусов картофеля в Новосибирской области. *Вавиловский журнал генетики и селекции*, 2024, 28(5): 554-562 (doi: 10.18699/vjgb-24-61).
89. Vologin S.G., Zamalieva F.F., Stasevski Z., Karasev A.V. Occurrence of alfalfa mosaic virus in

- potato (*Solanum tuberosum*) in Middle Volga Region of Russia. *Plant Disease*, 2019, 103(12): 3289 (doi: 10.1094/PDIS-03-19-0662-PDN).
90. Yanagisawa H., Matsushita Y., Khiutti A., Mironenko N., Ohto Y., Afanasenko O. Complete genome sequence of a divergent strain of potato virus P isolated from *Solanum tuberosum* in Russia. *Archives of Virology*, 2019, 164: 2891-2894 (doi: 10.1007/s00705-019-04397-5).
 91. Samarskaya V. O., Ryabov E. V., Gryzunov N., Spechenkova N., Kuznetsova M., Ilina I., Suprunov, T., Taliansk, M. E., Ivano, P.A., Kalinina N.O. The temporal and geographical dynamics of Potato virus Y diversity in Russia. *International Journal of Molecular Sciences*, 2023, 24(19): 14833 (doi: 10.3390/ijms241914833).
 92. Samarskaya V., Kuznetsova M., Gryzunov N., Spechenkova N., Bagdasarova P., Ryabov E., Taliansky M., Kalinina N. Identification of two novel recombinant types of Potato virus Y from *Solanum tuberosum* plants in southern region of Russia. *Plant Disease*, 2025, 109(5): 998-1003 (doi: 10.1094/PDIS-10-24-2151-SC).

ФГБНУ Всероссийский НИИ сельскохозяйственной
биотехнологии,
127550 Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, 42,
e-mail: marilistik@mail.ru, kromashkakro@ya.ru, v.taranov1@gmail.com

Поступила в редакцию
7 апреля 2025 года
Принята к публикации
30 апреля 2025 года

Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology], 2025, V. 60, № 5, pp. 777-791

POTATO VIRUSES IN RUSSIA (review)

M.V. Lebedeva, M.N. Polyakova, V.V. Taranov✉

All-Russian Research Institute of Agricultural Biotechnology, 42, ul. Timiryazevskaya, Moscow, 127550 Russia, e-mail marilistik@mail.ru, kromashkakro@ya.ru, v.taranov1@gmail.com (✉ corresponding author)

ORCID:

Lebedeva M.V. orcid.org/0000-0001-5711-8331

Taranov V.V. orcid.org/0000-0002-0728-0346

Polyakova M.N. orcid.org/0009-0004-8743-561X

The authors declare no conflict of interests

Acknowledgements:

Supported financially by the Russian Science Foundation, project № 23-76-01066

Final revision received April 07, 2025

doi: 10.15389/agrobiol.2025.5.777eng

Accepted April 30, 2025

Abstract

Potato (*Solanum tuberosum* L.) is one of the most important cultivated crops in Russia. Due to the vegetative propagation, potatoes are strongly susceptible to viral diseases, which can lead to a dramatic decrease in yield and tuber quality. According to state standards, seed potatoes should be tested for the 6 most relevant viruses during production, and the methods of detection are PCR, ELISA, and LFT. However, only a relatively small number of strains of a limited number of viruses can be detected using these methods, whereas 50 different viruses are known to occur on potato (J.F. Kreuze et., 2020). In addition, according to the Rosstat data, most of the potato plantings in Russia belong to private farms, which are not controlled in any way. Therefore, the relevant composition of viromes and genetic diversity of potato viruses in Russia remain obscure. Investigations of potato viruses that use high-throughput methods for virus detection and full-genomes characterization have been coming out only in recent years. The review focuses on the problem of the lack of virus studies on potatoes in Russia and reasons for a need to increase their number for timely monitoring of virus populations in potato plantings. Firstly, a general characterization of the most widespread potato viruses is provided, and studies devoted to their genomes diversity and phylogeography are reviewed. Then, the advantages and disadvantages of the most commonly used laboratory methods for virus diagnostic based on the detection of viral proteins or nucleic acids are discussed (R. Kumar et al, 2019). Viruses often occur in mixed infections with other viruses, which sometimes leads to cumulative infection effect (A.V. Moreno et al, 2020). Therefore, available information about viral co-interaction is provided. The last section is devoted to the investigations of potato virus in Russia, which were conducted using laboratory methods. The data irregularity for different regions is shown. One of the problems that complicate the characterization of a representative sample of each virus is the large area of territories in different regions of the Russian Federation where potatoes are grown. This problem can be solved by the wider introducing of high-throughput sequencing methods, which development makes them more available for researchers and which are actively used in some countries for the routine potato virus diagnostic.

Keywords: *Solanum tuberosum* L., virome, potato viruses, NGS, viral metagenome.