ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АБОРИГЕННОГО ТАГИЛЬСКОГО СКОТА ПО STR- И SNP-МАРКЕРАМ*

Ю.А. СТОЛПОВСКИЙ¹ ✉, С.В. БЕКЕТОВ¹, Е.В. СОЛОДНЕВА¹,
В.М. АБСАЛИКОВ², А.С. АБДЕЛЬМАНОВА³, Е.А. ГЛАДЫРЬ³,
Н.А. ЗИНОВЬЕВА³

Разведение специализированных пород или нескольких внутripородных линий снижает породное и генетическое разнообразие поголовья, и, как следствие, создается реальная угроза исчезновения аборигенного скота. Для изучения популяционно-генетической структуры местных пород, обладающих уникальными адаптивными признаками и устойчивостью к ряду заболеваний, чаще всего используют микросателлитный анализ либо более информативный метод полногеномного SNP (single nucleotide polymorphism) генотипирования. История создания тагильской породы насчитывает более 200 лет. В настоящее время в России и в мире осталось единственное генофондное стадо тагильского скота (около 600 гол.), однако молекулярно-генетические характеристики этого ограниченного по численности генофонда остаются недостаточно исследованными. В настоящем сообщении впервые представлены результаты идентификации STR- и SNP-генотипов уникальной местной тагильской породы. Цель работы — микросателлитный анализ (STR) и полногеномный анализ полиморфизма единичных нуклеотидов (SNPs) для оценки генетического разнообразия и установления популяционной структуры современной популяции аборигенного тагильского скота. Генотипы животных тагильской породы (TAGIL, $n = 98$; СПК им. Шорохова, Пермский край, 2021 год) исследовали методом мультиплексного анализа по 11 микросателлитам (TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA122, INRA023, TGLA126, BM1818, ETH225, BM1824). Для межпородной дифференциации по STR-маркерам методом главных компонент (PCA) привлекали генотипы пород, которые потенциально могли принимать участие в формировании современной популяции тагильского скота (TAGIL), — голштинской (HLST), холмогорской голштинизированной (татарстанский тип) (TAT), холмогорской чистопородной (печорский тип) (PECH), черно-пестрой (старый тип) (Ch_P_OLD), тагильской (TAG) (образцы из банка данных ОНИС БиоТехЖ, 2020 год, <https://www.vij.ru/2-obshchaya/226-infrastruktura-test>). Для генотипирования TAGIL по SNP-маркерам на основании результатов анализа STR-генотипов отобрали наиболее неродственных животных ($n = 48$) для охвата максимального спектра генетического разнообразия. Полногеномное генотипирование по SNP-маркерам выполняли с использованием ДНК-чипа высокой плотности GGP Bovine HD 150K BeadChip (~150 тыс. SNP, «Illumina, Inc.», США) (108432 SNP до и 62809 SNP после LD-фильтрации). Для анализа результатов генотипирования SNP-маркеров (популяционно-генетическое и филогенетическое исследования) сформировали базу данных полногеномных SNP-генотипов тагильского скота (TAGIL). В качестве группы сравнения в набор данных (data set) ввели животных голштинской породы (HLST) ($n = 45$). Мы четко дифференцировали породы отобранных животных (тагильскую и голштинскую) с помощью метода PCA. Кластерный анализ на основании генетических дистанций F_{ST} объединил животных тагильской и голштинской пород в две большие группы в соответствии с породной принадлежностью. Полногеномное SNP-генотипирование выявило геномные области, в которых аллельные варианты специфичны для тагильской породы. Анализ hapFLK показал наличие пяти районов ($p < 0,01$) (4-я, 5-я, 8-я, 11-я и 15-я хромосомы, длина от 1,20 Mb на BTA8 до 9,61 Mb на BTA5, число SNPs внутри регионов — от 24 до 92), находящихся под давлением отбора в исследованных группах тагильского скота. По данным STR-маркирования установлено участие холмогорского скота, а также черно-пестрой и голштинской пород в формировании тагильской породы. Отмечена наибольшая интрогрессия голштинского скота, который в последние десятилетия, вероятнее всего, использовался в качестве улучшающей породы для тагильского крупного рогатого скота. Более чем у 50 % животных тагильской породы обнаружен островок ROH (BTA14, позиции 24437778-25098364, длина 0,661 Mb), ранее идентифицированный у ярославской и холмогорской пород в качестве региона, находящегося под давлением отбора. Не исключено, что этот ROH-регион может быть элементом адаптивной генетической системы у аборигенных пород. У 40 % животных тагильской породы дополнительно присутствуют пять островков ROH. Полученные нами данные будут использованы для выявления генов и их вариантов, определяющих адаптивные и хозяйственно значимые признаки тагильской породы, изучения истории формирования ее генетической структуры, разработки регламентов мониторинга для сохранения породной специфичности и биоразнообразия тагильского скота.

Ключевые слова: молочный скот, тагильская порода, микросателлиты, SNP-геноти-

* Работа выполнена при поддержке гранта 19-76-20061 РФФИ (<http://rscf.ru>).

Интенсификация мирового молочного скотоводства приводит к преобладанию в структуре пород крупного рогатого скота (КРС) голштинских коров. Согласно статистике, голштинский скот (чистопородный или помесный) в совокупности составляет 61 % от 3,47 млн молочных коров Великобритании (1), в США доля КРС с голштинской породой в родословной еще больше — 90 % от общего числа дойных коров (2). В России поголовье голштинского скота пока еще не столь велико (22,95 %), но преобладает черно-пестрая порода (49,98 %) (3), в том числе частично голштинизированная. Разведение специализированных пород или нескольких внутripородных линий снижает породное и генетическое разнообразие поголовья, и, как следствие, создается реальная угроза исчезновения аборигенного скота. В этой связи изучение популяционно-генетической структуры местных пород, обладающих уникальными адаптивными признаками и устойчивостью к ряду заболеваний, привлекает все большее внимание (4). Чаще всего для таких исследований используют микросателлитный анализ либо более информативный метод полногеномного SNP (single nucleotide polymorphism) генотипирования, который стал активно применяться в популяционной генетике и при разведении КРС после расшифровки его генома (5).

С помощью STR (short tandem repeat) маркеров изучали генетическую структуру популяций местных пород индийских зебу — онголе, деони, гир, канкрей (6), мексиканского скота криолло (7), а также красной степной (8), суксунской, истобенской, ярославской, холмогорской, серой украинской и холмогорской (печорский тип) пород КРС (9). Полногеномный SNP скрининг использовали для установления генетического разнообразия и межпородной дифференциации аборигенного южноафриканского скота (африканер, дракенсбергер, нгуни) (10), пяти местных пород КРС в Бангладеш (читагонгская красная, пабна и зебу муншигандж, северный бенгальский серый, деши) (11), шести пород скота из провинции Сычуань в Китае (башаньский, сюаньханьский, пингву, саныцзянский, ганзи, ляншаньский) (12), ирландской породы керри (13) и российских стародавних пород — бестужевской, холмогорской, костромской, красной горбатовской и ярославской (14, 15).

Тагильский скот — одна из старейших отечественных пород крупного рогатого скота молочного направления в Российской Федерации. История создания этой породы насчитывает более 200 лет. Формирование основной группы тагильского скота происходило в Уральском регионе в районе Нижнего Тагила. Точных сведений о возникновении тагильского скота нет, но обсуждалось участие в его формировании английского короткорогатого и холмогорского скота, завезенного из Архангельской губернии в 1842 году (16). Высказывалось мнение, что тагильская порода — это продукт скрещивания местного уральского скота с завозимыми животными холмогорской, ярославской и голландской пород (17) и использования быков черно-пестрой породы (18). Плановая селекционно-племенная работа по улучшению тагильского скота началась после выхода декрета Совета Народных Комиссаров от 19 июля 1918 года «О племенном животноводстве». Тогда был применен жесткий отбор чистопородных тагильских быков-производителей с последующим разведением «в себе», что позволило существенно повысить продуктивность тагильских коров, и в 1930 году была утверждена

новая тагильская порода КРС (18, 19). Неприхотливый к условиям кормления и содержания тагильский скот при разведении на Урале мало уступал по удою черно-пестрому, превосходя его по жирномолочности. К тому же тагильские коровы в силу специфического строения таза выделяются легкостью отела.

Впоследствии массовая голштинизация КРС привела к вытеснению не только тагильской, но и черно-пестрой породы. В результате в настоящее время осталось единственное в России и мире генофондное стадо тагильского скота (около 600 гол.), сформированное на базе СПК им. Шорохова в Октябрьском районе Пермского края. Этот ограниченный по численности генофонд представляет несомненный интерес как источник ценных биологических и хозяйственных признаков, однако его молекулярно-генетические характеристики остаются недостаточно исследованными.

В настоящем сообщении впервые представлены результаты идентификации STR- и SNP-генотипов уникальной местной тагильской породы КРС, что позволит выявлять гены и их варианты, которые определяют биологические, адаптивные и продуктивные качества животных, имеющие экономическое значение.

Цель выполненной работы — провести микросателлитный анализ (STR) и полногеномный анализ полиморфизма единичных нуклеотидов (SNPs) для оценки генетического разнообразия и установления популяционной структуры современной популяции аборигенного тагильского скота.

Методика. ДНК выделяли из образцов крови ($n = 98$) животных тагильской породы (TAGIL). Образцы отбирали в СПК им. Шорохова (Пермский край, 2021 год), для выделения ДНК использовали набор QI-Amp® DNA Mini Kit («QIAGEN», Германия) согласно прилагаемому протоколу. Определяли чистоту и концентрацию полученных препаратов ДНК (OD_{260/280}, ультрафиолетовый микроспектрофотометр Implen Nano-Photometer®, «Implen GmbH», Германия), концентрацию двуцепочечной ДНК измеряли с помощью флуориметра Qubit™ (1.0) («Life Technologies», США).

Генотипы животных исследовали методом мультиплексного анализа по 11 микросателлитам (TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA122, INRA023, TGLA126, BM1818, ETH225, BM1824), используя STR-панель, разработанную в ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на основе рекомендаций International Society for Animal Genetics (ISAG).

Межпородную дифференциацию по STR-маркерам проводили методом главных компонент (PCA) с привлечением генотипов пород КРС, которые потенциально могли принимать участие в формировании изучаемой современной популяции тагильского скота (TAGIL), — голштинской (HLST), холмогорской голштинизированной (татарстанский тип) (TAT), холмогорской чистопородной (печорский тип) (PECH), черно-пестрой (старый тип) (Ch_P_OLD), тагильской (TAG) (образцы из банка данных ОНИС БиоТехЖ, 2020 год, <https://www.vij.ru/2-obshchaya/226-infrastruktura-test>).

Для генотипирования по SNP-маркерам отобрали образцы ($n = 48$) на основании результатов анализа STR-генотипов. В программе Structure 2.3.4 (<https://web.stanford.edu/group/pritchardlab/structure.html>) по коэффициенту подобия Q предварительно оценивали чистопородность и в программе ML-Relate (<https://www.montana.edu/kalinowski/software/ml-relate/index.html>) — степень родства индивидуумов исследуемой популяции тагильского скота.

Полногеномное генотипирование по SNP-маркерам выполняли с использованием ДНК-чипа высокой плотности GGP Bovine HD 150K Bead-Chip (~ 150 тыс. SNP, «Illumina, Inc.», США). Контроль качества и фильтрацию данных генотипирования для каждого образца и SNP выполняли с использованием программного пакета PLINK 1.9 (20) (<https://www.co-genomics.org/plink/>). Были применены следующие фильтры (в скобках даны соответствующие команды в программе PLINK): call-rate по всем исследуемым SNP для индивидуального образца не ниже 90 % (--mind); call-rate для каждого из исследованных SNP по всем генотипированным образцам не ниже 90 % (--geno); частота встречаемости минорных аллелей (MAF) более 0,01 или 0,05 (--maf 0.01); отклонение SNP генотипов от распределения Харди-Вайнберга в совокупности протестированных образцов с достоверностью $p\text{-value} < 10^{-6}$ (--hwe). Также оценивали неравновесие по сцеплению (LD, linkage disequilibrium) с помощью коэффициента корреляции Пирсона ($r^2 < 0,2$) с шагом 50 kb (--indep-pairwise).

Для анализа результатов генотипирования SNP-маркеров (популяционно-генетическое и филогенетическое исследования) сформировали базу данных полногеномных SNP-генотипов тагильского скота (TAGIL). В качестве группы сравнения в набор данных (data set) ввели животных голштинской породы (HLST) ($n = 45$).

На основании полученных SNP-генотипов для каждого из набора данных в R пакете diveRsity (21) рассчитывали наблюдаемую гетерозиготность (H_o), несмещенную ожидаемую гетерозиготность (uHe), аллельное разнообразие (Ar) и коэффициент инбридинга F_{is} (с 95 % доверительным интервалом).

Анализ главных компонент (PCA) выполняли в программе PLINK 1.9 с последующим построением графика в R пакете ggplot2 (22). Для филогенетических исследований в R пакете diveRsity (21) рассчитывали попарные значения F_{st} (23). Матрицу попарных значений F_{st} визуализировали в виде групповой генетической сети Neighbor-net в программе SplitsTree 4.14.5 (24) (<https://splitstree4.software.informer.com/>). Популяционную структуру и генетическую однородность изучаемых пород КРС устанавливали в программе Admixture 1.3 (25) с графическим представлением с помощью R пакета pophelper (26). Наиболее вероятное число предковых кластеров (K) определяли с помощью расчета значений ошибки кросс-валидации (CV error) для K от 1 до 5 в программе Admixture 1.3.

Для поиска локусов, находящихся под давлением отбора, использовали отбор 0,1 % SNPs, имеющих наибольшие значения F_{st} при парном сравнении пород, а также анализ hapFLK и выявление островков ROH, перекрывающихся у некоторых индивидуумов (15). Для островков минимальный размер ROH принимали равным 0,5 Mb при 50 % животных, несущих перекрывающиеся ROH, и длине перекрывания ROH не менее 0,1 Mb.

Биоинформатическую обработку данных и построение графиков проводили с помощью программной среды R Project for Statistical Computing (27).

При hapFLK анализе был установлен порог достоверности $p < 0,01$. Для значений F_{is} приведены доверительные интервалы (CI, 95 %). При определении средних значений показателей (M) рассчитывали их стандартные ошибки ($\pm SEM$).

Результаты. Результаты анализа главных компонент (PCA) (рис. 1) были получены по данным проведенного нами микросателлитного профилирования животных тагильской породы в сравнении с данными выполненного ранее STR-генотипирования популяций голштинской, холмогорской (голштинизированной и чистопородной), черно-пестрой и тагильской пород КРС. Можно видеть, что значительная часть коров тагильской породы отличается от животных других пород, но массивы обеих популяций тагильского скота перекрываются с голштинской породой. На этом основании мы в дальнейшем рассматривали голштинскую породу в качестве группы сравнения.

Рис. 1. Распределение особей тагильской породы на основании генотипов по STR-маркерам при анализе методом главных компонент: современная популяция тагильского скота (TAGIL, $n = 98$) (СПК им. Шорохова, Пермский край, 2021 год), голштинская порода (HLST), холмогорская голштинизированная порода (тагистанский тип) (TAT), холмогорский чистопородный скот (печорский тип) (PECH), черно-пестрая порода (старый тип) (Ch_P_OLD), тагильский скот (TAG) (образцы из банка данных ОНИС БиоТехЖ, 2020 год).

Для охвата максимального спектра генетического разнообразия тагильской породы для SNP-генотипирования отбирали наиболее неродственных животных. На основе расчета коэффициента подобия (Q) и оценки степени родства (родственниками считали особей с $Q \geq 0,35$) отобрали 51 животное (48 основных и 3 запасных). Отобранных особей разделили на пять групп: 1-я — $Q \geq 90 \%$, родственников не > 2 у каждого животного (хотя есть близкие с $Q = 0,50$; 37 коров); 2-я — $90 \% > Q \geq 80 \%$, родственников не > 2 у каждого животного (хотя есть близкие с $Q = 0,50$; 7 коров); 3-я — $80 \% > Q \geq 70 \%$, у каждого животного > 1 родственника (нет ближе, чем с $Q = 0,49$; 5 коров); 4-я — $70 \% > Q \geq 60 \%$, нет родственников (2 коровы); 5-я (прочие) — нежелательны для генотипирования.

Полногеномное генотипирование тагильского скота по SNP-маркерам проводили с использованием ДНК-чипа GGP Bovine HD 150K Bead-Chip, результаты получили для 48 животных (результативность генотипирования составила более 90 %). Эффективность генотипирования (call rate) исследуемых коров тагильской породы варьировала от 0,9900 до 0,9982. Всего после контроля качества для анализа отобрали 108432 SNP.

Таблица 1 обобщает данные проведенного нами популяционно-генетического исследования тагильской породы по SNP-маркерам в сравнении с голштинской. Можно видеть достоверно более высокое генетическое разнообразие (по показателям аллельного разнообразия A_r , наблюдаемой гетерозиготности H_o и несмещенной ожидаемой гетерозиготности iH_e) тагильского скота по сравнению с голштинским. Это может быть следствием как менее жесткого отбора по хозяйственно полезным признакам, так и участия нескольких пород в создании тагильского скота. Следует также отметить избыток гетерозигот в обеих популяциях (см. табл. 1).

1. Сравнительная характеристика генетического разнообразия популяции тагильского скота (СПК им. Шорохова, Пермский край, 2021 год) и голштинского скота (банк данных ОНИС БиоТехЖ, 2020 год) по SNP-маркерам ($M \pm SEM$, GGP Bovine HD 150K BeadChip, «Illumina, Inc.», США)

Порода	<i>n</i>	Ar	Ho	uHe	Fis [CI 95 %]
Тагильская	48	1,999±0	0,408±0,001	0,398±0,000	-0,023 [-0,024; -0,022]
Голштинская	45	1,989±0	0,366±0,001	0,360±0,001	-0,014 [-0,015; -0,013]

Рис. 2. Распределение особей тагильской (TAGIL, *n* = 48) (СПК им. Шорохова, Пермский край, 2021 год) и голштинской пород (HLST, банк данных ОНИС БиоТехЖ, 2020 год) на основании генотипов по 108432 SNPs.

Мы четко дифференцировали породы отобранных животных (тагильскую и голштинскую) с помощью метода PCA (рис. 2). При этом в отличие от тагильской голштинская порода оказалась более консолидированной (см.

рис. 2), первая компонента (PC1) отвечала за 7,28 % генотипической изменчивости и отделяла тагильский скот от голштинского.

Кластерный анализ на основании генетических дистанций *F_{ST}* (рис. 3) объединил животных тагильской и голштинской пород в две большие группы в соответствии с породной принадлежностью. Животные, относящиеся к одной и той же породе, группировались на соседних ветвях соответствующих кластеров.

Рис. 3. Дендрограмма Neighbor-net, построенная на основании генотипов по 108432 SNPs для отобранных животных тагильской (TAGIL, *n* = 48) (СПК им. Шорохова, Пермский край, 2021 год) и голштинской пород (HLST, *n* = 45, банк данных ОНИС БиоТехЖ, 2020 год) (визуализация в программе SplitsTree 4.14.5).

При проведении структурного анализа расчет ошибки кросс-вали-

дации (CV) показал минимальное значение этого показателя для числа кластеров $K = 4$. При $K = 2$ (рис. 4) каждая из двух сравниваемых пород (TAGIL и HLST) проявляет специфическую кластерную структуру, при этом в формировании тагильской породы прослеживается наличие специфических голштинских предковых геномных компонентов. Анализ генетической структуры при $K = 3$ и $K = 4$ указывает на участие в формировании тагильской породы еще трех различных предковых пород дополнительно к голштинской. Учитывая, что специфические голштинские геномные компоненты проявляются у большей части животных тагильской породы, а компоненты трех других предковых пород тагильского скота имеют лишь незначительные следы адмиксии в голштинской породе, полученный набор данных можно считать пригодным для поиска локусов, находящихся под давлением отбора.

Рис. 4. Генетическая структура популяции тагильской породы крупного рогатого скота (TAGIL, $n = 48$, СПК им. Шорохова, Пермский край, 2021 год) по сравнению с голштинской (HLST, $n = 45$, банк данных ОНИС БиоТехЖ, 2020 год) по результатам анализа *Admixture* с использованием 62809 SNPs (программа *Admixture* 1.3, K — число кластеров). Синий и желтый цвета — геномные компоненты предковых пород, выявленные в тагильской породе.

При выборе 0,1 % SNPs, имеющих наибольшие значения F_{ST} при парном сравнении пород, идентифицировали 109 SNPs, локализованных на 24 хромосомах (за исключением ВТА8, ВТА23, ВТА27, ВТА28 и ВТА29).

Анализ *hapFLK* показал наличие пяти районов ($p < 0,01$), находящихся под давлением отбора в исследованных группах тагильского скота (табл. 2) в сопоставлении с голштинским. Выявленные области локализовались на 4-й, 5-й, 8-й, 11-й и 15-й хромосомах, при этом для двух регионов был установлен более высокий уровень достоверности идентификации ($p < 0,001$). Длина регионов варьировала от 1,20 Mb (ВТА8) до 9,61 Mb (ВТА5), число SNPs, локализованных внутри указанных регионов, изменялось от 24 до 92.

2. Характеристика участков хромосом (ВТА), находящихся под давлением отбора у тагильского скота (TAGIL, $n = 48$, анализ методом *hapFLK*, СПК им. Шорохова, Пермский край, 2021 год)

ВТА	Позиция		Длина, Mb	Наиболее значимый SNPs		Число SNPs
	начальная	конечная		позиция	p	
4-я	6 842 949	10 648 384	3,81	8 495 236	7,08E-04	63
5-я	16 952 114	26 561 662	9,61	24 064 770	8,42E-04	92
8-я	50 695 489	51 899 568	1,20	51 101 318	5,14E-03	24
11-я	86 926 025	89 081 028	2,16	88 186 796	6,16E-03	31
15-я	48 905 274	54 898 376	5,99	54 218 907	5,08E-03	59

В результате исследования геномов тагильского и голштинского

скота на наличие участков гомозиготности (runs of homozygosity — ROH) мы выявили 37 островков ROH, которые встречались более чем у 50 % животных, причем 36 таких регионов было обнаружено в геноме голштинского скота, и лишь один — у тагильского (BTA14, позиции 24437778-25098364, длина 0,661 Mb). Интересно, что этот регион практически полностью перекрывался с идентичным регионом, идентифицированным в геноме голштинского скота (позиции 24437778-25175950, длина 0,750 Mb). Следует отметить, что регион на BTA14 в области 24,4-25,1 сМ ранее был идентифицирован как находящийся под давлением отбора у ярославской и холмогорской пород скота (15). Проведенная структурная аннотация выявила локализацию в этой области восьми генов — *XKR4*, *TMEM68*, *TGS1*, *LYN*, *RPS20*, *MOS*, *PLAG1* и *CHCHD7*. Ранее в исследованиях на разных породах скота (голштинская, симментальская, вагю, хану и др.) было показано, что перечисленные гены ассоциированы с ростом, экстерьерной высокорослостью, живой массой и потреблением корма (28-33).

Исходя из того, что при совершенствовании тагильского скота его скрещивали не только с голштинской, но и с другими черно-пестрыми породами крупного рогатого скота (холмогорская и черно-пестрая), мы снизили до 40 % порог доли животных тагильской породы, в геноме которых встречаются общие ROH. Это позволило дополнительно идентифицировать у тагильской породы пять островков ROH (табл. 3).

3. Характеристика островков ROH, идентифицированных в геноме тагильского скота (TAGIL, *n* = 48, порог доли животных с общими ROH — 40 %, СПК им. Шорохова, Пермский край, 2021 год)

Порода	BTA	Число SNP	Позиция		Длина, Mb	Доля животных, %
			начальная	конечная		
TAGIL	2-я	15	65 513 882	65 946 493	0,433	41,7
TAGIL	14-я	15	33 026 716	33 348 218	0,322	41,7
TAGIL	16-я	4	44 372 045	44 552 678	0,181	41,7
TAGIL	20-я	17	71 433 871	71 720 853	0,287	41,7
TAGIL	23-я	18	479 600	936 645	0,457	41,7

Таким образом, в результате проведенных исследований дана характеристика популяционно-генетических особенностей современного тагильского скота и создана база полногеномных SNP-генотипов, отвечающая установленным критериям качества (число генотипированных животных с результативностью генотипирования более 90 %). По данным STR-маркирования установлено участие холмогорского скота, а также черно-пестрой и голштинской пород в формировании тагильской породы. Отмечена наибольшая интрогрессия голштинского скота, который в последние десятилетия, вероятнее всего, использовался в качестве улучшающей породы для тагильского крупного рогатого скота. В анализируемой популяции животные тагильской породы дифференцируются от голштинского скота и представляют собой генотипически менее консолидированную и менее структурированную группу. В отличие от голштинского скота тагильский характеризовался достоверно ($p < 0,05$) более высоким генетическим разнообразием и избытком гетерозигот. Полногеномное SNP-генотипирование выявило геномные области, в которых аллельные варианты специфичны для тагильской породы. При сравнении тагильской и голштинской пород на 24 хромосомах идентифицированы 109 SNPs с наибольшими значениями *F_{ST}* при парном сравнении, выявлены пять регионов, находящихся под давлением отбора ($p < 0,01$) у тагильского и голштинского скота, которые локализованы на 4-й, 5-й, 8-й, 11-й и 15-й хромосомах. Более чем у 50 % жи-

вотных тагильской породы обнаружен островок РОН (ВТА14, позиции 24437778-25098364, длина 0,661 Mb), ранее идентифицированный у ярославской и холмогорской пород в качестве региона, находящегося под давлением отбора. Не исключено, что этот РОН-регион может быть элементом адаптивной генетической системы у аборигенных пород. У 40 % животных тагильской породы дополнительно присутствуют пять островков РОН. Полученные нами данные будут использованы для выявления генов и их вариантов, определяющих адаптивные и хозяйственно значимые признаки тагильской породы, изучения истории формирования ее генетической структуры, разработки регламентов мониторинга для сохранения породной специфичности и биоразнообразия тагильского скота.

¹ФГБУН Институт общей генетики
им. Н.И. Вавилова РАН,
119333 Россия, ГСП-1, г. Москва, ул. Губкина, 3,
e-mail: stolpovsky@mail.ru ☒, svbektov@gmail.com,
eugenia.575.2012@yandex.ru;

Поступила в редакцию
1 сентября 2021 года

²Управление сельского хозяйства
Октябрьского района Пермского края,
617860 Россия, Пермский край, рп. Октябрьский, ул. Ленина, 57,
e-mail: vabs1966@gmail.com;

³ФГБНУ ФИЦ животноводства —
ВИЖ им. академика Л.К. Эрнста,
142132 Россия, Московская обл., г.о. Подольск, пос. Дубровицы, 60,
e-mail: preevetic@mail.ru, elenagladyr@mail.ru, n_zinovieva@mail.ru

Sel'skokhozyaystvennaya biologiya [Agricultural Biology], 2021, V. 56, № 6, pp. 1123-1133

THE POPULATION-GENETIC STRUCTURE OF NATIVE TAGIL CATTLE BY STR- AND SNP-MARKERS

Yu.A. Stolpovsky¹ ☒, S.V. Beketov¹, E.V. Solodneva¹, V.M. Absalikov², A.S. Abdelmanova³,
E.A. Gladyr³, N.A. Zinovieva³

¹Vavilov Institute of General Genetics RAS, 3, ul. Gubkina, Moscow, 119333 Russia, e-mail stolpovsky@mail.ru
(☒ corresponding author), svbektov@gmail.com, eugenia.575.2012@yandex.ru;

²Department of Agriculture, Oktyabrsky District of Perm Krai, 57, ul. Lenina, Oktyabrsky District, Perm Krai,
617860 Russia, e-mail vabs1966@gmail.com;

³Ernst Federal Research Center for Animal Husbandry, 60, pos. Dubrovitsy, Podolsk District, Moscow Province,
142132 Russia, e-mail preevetic@mail.ru, elenagladyr@mail.ru, n_zinovieva@mail.ru

ORCID:

Stolpovsky Yu.A. orcid.org/0000-0003-2537-1900

Abdelmanova A.S. orcid.org/0000-0003-4752-0727

Beketov S.V., orcid.org/0000-0001-7947-8688

Gladyr E.A. orcid.org/0000-0002-5210-8932

Solodneva E.V. orcid.org/0000-0002-7178-4012

Zinovieva N.A. orcid.org/0000-0003-4017-6863

The authors declare no conflict of interests

Acknowledgements:

Supported financially by the grant 19-76-20061 of the Russian Science Foundation (<http://rscf.ru>)

Received September 1, 2021

doi: 10.15389/agrobiol.2021.6.1123eng

Abstract

Rearing specialized cattle breeds or several intra-breed lines reduces the breed and genetic diversity and creates a real threat of extinction of native livestock. Microsatellite analysis and genome-wide SNP (single nucleotide polymorphism) genotyping are common methods to study the population genetic structure of local breeds with unique adaptive traits and diseases resistance. The history of the Tagil breed is more than 200 years old. Currently, in Russia and the world, there is the only herd of Tagil cattle of about 600 animals molecular genetic characteristics of which remain insufficiently poor studied. Here we present the first results of identification of STR and SNP genotypes of the unique local Tagil breed. The work aimed to assess genetic diversity and survey the population structure of the modern population of indigenous Tagil cattle by microsatellite analysis (STR) and genome-wide analysis of single nucleotide polymorphism (SNPs). Genotypes of the Tagil animals (TAGIL, $n = 98$; SPK Shorokhov, Perm Territory, 2021) were studied by multiplex analysis using 11 microsatellites (TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA122, INRA0623, TGL1812 ETH225, BM1824). For interbreed differentiation by STR markers in PCA, we used a set of breeds that could be potentially involved in the formation of the modern population of Tagil

cattle (TAGIL) — Holstein (HLST), Kholmogory Holsteinized (Tatarstan type) (TAT), Kholmogorsk purebred (Pechora type) (PECH), black-and-white (old type) (Ch_P_OLD), Tagil (TAG) (samples from the ONIS BioTechZh database, 2020, <https://www.vij.ru/2-obshchaya/226-infrastruktura-test>). To cover maximum genetic diversity in genotyping of TAGIL by SNP markers, the most unrelated animals ($n = 48$) were selected based on the results of analysis of STR genotypes. Genome-wide genotyping for SNP markers was performed using a high density GGP Bovine HD 150K BeadChip DNA chip (150,000 SNPs, Illumina, Inc., USA) (10,8432 SNPs before and 62,809 SNPs after LD filtration). A database of genome-wide SNP genotypes of Tagil cattle (TAGIL) was formed to analyze the results of SNP genotyping (population genetic and phylogenetic studies). Holstein animals (HLST) ($n = 45$) were the reference group. We clearly differentiated the Tagil (TAGIL) and Holstein animals by PCA method. Cluster analysis based on genetic distances F_{ST} divided the Tagil and Holstein animals into two separate groups. Genome-wide SNP genotyping revealed genomic regions in which allelic variants are specific for the Tagil cattle (TAGIL). The hapFLK analysis showed five regions ($p < 0.01$) (chromosomes 4, 5, 8, 11, and 15, from 1.20 Mb on BTA8 to 9.61 Mb on BTA5, the number of SNPs within the regions from 24 to 92) under selection pressure in the Tagil animals (TAGIL). The STR genotyping data showed the participation of the Kholmogory cattle, Black-and-White and Holstein breeds in the Tagil breed formation with the greatest introgression of Holstein cattle which most likely was used to improve Tagil cattle in recent decades. We revealed that more than 50 % of the Tagil animals (TAGIL) have the ROH (BTA14, positions 24437778-25098364, 0.661 Mb) previously identified in the Yaroslavl and Kholmogor breeds as a region under selection pressure. This ROH region may be an element of the adaptive genetic system in indigenous Russian breeds. In 40 % Tagil animals, we additionally identified five ROH islands. The findings of the research will be used to identify genes and their variants that determine adaptive and commercial traits of the Tagil breed, study the formation of its genetic structure, develop monitoring regulations to preserve the Tagil cattle breed specificity and biodiversity.

Keywords: dairy cattle, Tagil breed, microsatellites, SNP genotyping, biodiversity.

REFERENCES

1. *Most common of cattle in GB (NUTS 1 areas) in 01 April 2005*. London, 2005, Version 1.
2. *Holstein Association USA*. Available: <http://holsteinusa.com>. No date.
3. *Ezhegodnik po plemennoi rabote v molochnom skotovodstve v khozyaistvakh Rossiiskoi Federatsii (2019 g.)* [Yearbook on pedigree work in dairy cattle breeding on the farms of the Russian Federation (2019)]. Moscow, 2020 (in Russ.).
4. Mwai O., Hanotte O., Kwon Y.-J., Cho S. African indigenous cattle: unique genetic resources in a rapidly changing world. *Asian Australas. J. Anim. Sci.*, 2015, 28(7): 911-921 (doi: 10.5713/ajas.15.0002R).
5. Elvik C.G., Bovine Genome Sequencing and Analysis Consortium. The genome sequence of taurine cattle: a window to ruminant biology and evolution. *Science*, 2009, 324(5926): 522-528 (doi: 10.1126/science.1169588).
6. Kale D.S., Rank D.N., Joshi C.G., Yadav B.R., Koringa P.G., Thakkar K.M., Tolankhomba T.C., Solanki J.V. Genetic diversity among Indian Gir, Deoni and Kankrej cattle breeds based on microsatellite markers. *Indian Journal of Biotechnology*, 2010, 9: 126-130.
7. Ulloa-Arvizu R., Gayosso-Vazquez A., Ramos-Kuri M., Estrada F.J., Montano M., Alonso R.A. Genetic analysis of Mexican Criollo cattle populations. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 2008, 125: 351-359 (doi: 10.1111/j.1439-0388.2008.00735.x).
8. Kramarenko A.S., Gladyr E.A., Kramarenko S.S., Pidpala T.V., Strikha L.A., Zinovieva N.A. Genetic diversity and bottleneck analysis of the Red Steppe cattle based on microsatellite markers. *Ukrainian Journal of Ecology*, 2018, 8(2): 12-17 (doi: 10.15421/2018_303).
9. Kiseleva T.Yu., Kantanen J., Vorobyov N.I., Podoba B.E., Terletsky V.P. Linkage disequilibrium analysis for microsatellite loci in six cattle breeds. *Russian Journal of Genetics*, 2014, 50(4): 406-414 (doi: 10.1134/S1022795414040048).
10. Zwane A.A., Schnabel R.D., Hoff J., Choudhury A., Makgahlela M.L., Maiwashe A., Van Marle-Koster E., Taylor J.T. Genome-Wide SNP discovery in indigenous cattle breeds of South Africa. *Front. Genet.*, 2019, 10(273): 1-16 (doi: 10.3389/fgene.2019.00273).
11. Bhuiyan M.S.A., Lee S.-H., Hossain S.M.J., Deb G.K., Afroz M.F., Lee, S.-H., Bhuiyan A.K.F.H. Unraveling the genetic diversity and population structure of Bangladeshi indigenous cattle populations using 50K SNP markers. *Animals*, 2021, 11(2381): 1-15 (doi: 10.3390/ani1108238).
12. Wang W., Gan J., Fang D., Tang H., Wang H., Yi J., Fu M. Genome-wide SNP discovery and evaluation of genetic diversity among six Chinese indigenous cattle breeds in Sichuan. *PLoS ONE*, 2018, 13(8): e0201534 (doi: 10.1371/journal.pone.0201534).
13. Browett S., McHugo G., Richardson I.W., Magee D.A., Park S.D.E., Fahey A.G., Kearney J.F., Correia C.N., Randhawa I.A.S., MacHugh D.E. Genomic characterisation of the indigenous Irish Kerry Cattle breed. *Front. Genet.*, 2018, 9(51): 1-17 (doi: 10.3389/fgene.2018.00051).

14. Zinov'eva N.A., Dotsev A.V., Sermyagin A.A., Vimmers K., Reier Kh., Solkner I., Denis-kova T.E., Brem G. Study of genetic diversity and population structure of five Russian cattle breeds using whole-genome SNP analysis. *Sel'skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology]*, 2016, 51(6): 788-800 (doi: 10.15389/agrobiology.2016.6.788eng).
15. Zinov'eva N.A., Dotsev A.V., Sermyagin A.A., Deniskova T.E., Abdelmanova A.S., Kharzi-nova V.R., Sölkner J., Reyer H., Wimmers K., Brem G. Selection signatures in two oldest Russian native cattle breeds revealed using high-density single nucleotide polymorphism analysis. *PLoS ONE*, 2020, 15(11): e0242200 (doi: 10.1371/journal.pone.0242200).
16. Romanov A.I. V sbornike: *Trudy soveshchaniya veterinarnykh vrachei i predstavitelei zemstv* [In: Proceedings of the meeting of veterinarians and representatives of zemstvos]. Perm', 1913: 11-129 (in Russ.).
17. *Puti i formy sozdaniya i sokhraneniya genofonda tsennykh lokal'nykh porod* [Ways and forms of creating and preserving the gene pool of valuable local breeds]. Leningrad, 1979 (in Russ.).
18. Kremer L.A. *Tagil'skii skot* [Tagil cattle]. Moscow-Leningrad, 1931 (in Russ.).
19. Moiseeva I.G., Ukhanov S.V., Stolpovskii Yu.A. et al. *Genofondy sel'skokhozyaistvennykh zhivotnykh: geneticheskie resursy zhivotnovodstva Rossii* /Pod red. I.A. Zakharova [Gene pools of farm animals: genetic resources of animal husbandry in Russia. I.A. Zakharov (ed.)]. Moscow, 2006 (in Russ.).
20. *Plink: Whole genome association analysis toolset*. Available: <http://zzz.bwh.harvard.edu/plink/>. Accessed 25.01.2017.
21. Keenan K., McGinnity P., Cross T.F., Crozier W.W., Prodöhl P.A. diveRsity: an R package for the estimation of population genetics parameters and their associated errors. *Methods in Ecology and Evolution*, 2013, 4(8): 782-788 (doi: 10.1111/2041-210X.12067).
22. Wickham H. *ggplot2: elegant graphics for data analysis*. N.-Y., 2009.
23. Weir B.S., Cockerham C.C. Estimating F-statistics for the analysis of population structure. *Evo-lution*, 1984, 38(6): 1358-1370 (doi: 10.2307/2408641).
24. Huson D.H., Bryant D. Application of phylogenetic networks in evolutionary studies. *Molecular Biology and Evolution*, 2006, 23(2): 254-267 (doi: 10.1093/molbev/msj030).
25. Alexander D.H., Novembre J., Lange K. Fast model-based estimation of ancestry in unrelated individuals. *Genome Research*, 2009, 19(9): 1655-1664 (doi: 10.1101/gr.094052.109).
26. Francis R.M. pophelper: An R package and web app to analyse and visualise population structure. *Molecular Ecology Resources*, 2017, 17(1): 27-32 (doi: 10.1111/1755-0998.12509).
27. R Core Team. *R: a language and environment for statistical computing*. R foundation for statistical computing, Vienna, 2018. Available: <https://www.R-project.org/>. No date.
28. Lindholm-Perry A.K., Kuehn L.A., Smith T.P., Ferrell C.L., Jenkins T.G., Freetly H.C., Snel-ling W.M. A region on BTA14 that includes the positional candidate genes LYPLA1, XKR4 AND TMEM68 is associated with feed intake and growth phenotypes in cattle. *Anim Genet.*, 2012, 43: 216-219 (doi: 10.1111/j.1365-2052.2011.02232.x).
29. Pryce J.E., Arias J., Bowman P.J., Davis S.R., Macdonald K.A., Waghorn G.C., Wales W.J., Williams Y.J., Spelman R.J., Hayes B.J. Accuracy of genomic predictions of residual feed intake and 250-day body weight in growing heifers using 625,000 single nucleotide polymorphism mark-ers. *J. Dairy Sci.*, 2012, 95(4): 2108-2119 (doi: 10.3168/jds.2011-4628).
30. Taye M., Yoon J., Dessie T., Cho S., Oh S.J., Lee H.K., Kim H. Deciphering signature of selection affecting beef quality traits in Angus cattle. *Genes Genomics*, 2018, 40(1): 63-75 (doi: 10.1007/s13258-017-0610-z).
31. Cheruiyot E.K., Bett R.C., Amimo J.O., Zhang Y., Mrode R., Mujibi F.D.N. Signatures of selection in admixed dairy cattle in Tanzania. *Front. Genet.*, 2018, 9(607): 1-15 (doi: 10.3389/fgene.2018.00607).
32. De Las Heras-Saldana S., Clark S.A., Duijvesteijn N., Gondro C., van der Werf J.H.J., Chen Y. Combining information from genome-wide association and multi-tissue gene expression studies to elucidate factors underlying genetic variation for residual feed intake in Australian Angus cattle. *BMC Genomics*, 2019, 20(1): 939 (doi: 10.1186/s12864-019-6270-4).
33. Grigoletto L., Ferraz J.B.S., Oliveira H.R., Eler J.P., Bussiman F.O., Abreu Silva B.C., Baldi F., Brito L.F. Genetic architecture of carcass and meat quality traits in Montana tropical composite beef cattle. *Front. Genet.*, 2020, 11(123): 1-13 (doi: 10.3389/fgene.2020.00123).